

Surveillance hebdomadaire de la Grippe à Madagascar Semaine 15-09



Manao ahoana ?

Situation à Antananarivo :

- 11 prélèvements analysés de la semaine 14-09. 9 sont négatifs et 2 sont en cours de traitement.
- 11 prélèvements reçus durant la semaine 15-09 en cours de traitement.

Situation sur le reste du territoire :

- Antsirabe : 12 prélèvements analysés de la semaine 14-09 tous négatifs. 4 prélèvements reçus durant la semaine 15-09 en cours de traitement.
- Taolagnaro : 2 prélèvements reçus la semaine 13-09 et 14-09 sont en cours de traitement.

Rien à signaler pour les autres sites

Conclusion. Depuis la semaine 11-09, nous n'avons pas détecté de virus grippaux. Les syndromes grippaux à Antananarivo (OSTIE) ont cependant nettement augmenté cette semaine 15-09 avec 7,9 % du nombre total de consultants. Cette augmentation pourrait-être due un simple rajustement du à la reprise des activités de service et au fait que la population ait moins fréquentée les centres de santé durant les troubles politiques. Cependant une seconde explication pourrait venir de la circulation du virus respiratoires syncytiaux (VRS). Pour l'heure sur 22 prélèvements testés entre les semaines 11-09 et 14-09, nous avons détecté ce virus dans 60% des cas (13).

Informations : Le virus respiratoire syncytial (VRS) cause une infection des poumons et des voies aériennes. Il est courant chez les nourrissons et les jeunes enfants. Chez les enfants de moins de 3 ans, le VRS peut être plus grave; il peut causer une infection des voies aériennes inférieures, comme la bronchiolite ou la pneumonie. Chez les enfants plus âgés et les adultes, les symptômes sont généralement bénins. Dans la plupart des cas d'infection par le VRS cause des symptômes de types rhumes :

- congestion et écoulement nasal
- toux
- faible fièvre
- mal de gorge

Les symptômes peuvent durer de 1 à 2 semaines, mais la toux peut persister plus de 2 semaines. non négligeable de dyspnée.

Le traitement reste essentiellement symptomatique, et les antibiotique ne sont préconisés que si une otite se déclare ou si il n'y a pas d'amélioration au bout de 2-3 jours (fièvres et atteinte respiratoire importante). Les jeunes enfants et nourrissons sont à surveiller car l'infection peut évoluer vers une pneumonie.


**Données générées par le Centre National de Référence pour la Grippe
Institut Pasteur de Madagascar**

1



*Toute utilisation de ces données à des fins de publication ou de présentation publique est interdite sans accord préalable du
Center National de référence pour la Grippe ou de l'Institut Pasteur de Madagascar*

Pour toute demande d'information, vous pouvez nous contacter à l'adresse e-mail suivante :
National Influenza Center Madagascar: nic-mada@pasteur.mg

Surveillance hebdomadaire de la Grippe à Madagascar Semaine 15-09



Données comparatives pour les deux dernières années.



**Données générées par le Centre National de Référence pour la Grippe
Institut Pasteur de Madagascar**

Toute utilisation de ces données à des fins de publication ou de présentation publique est interdite sans accord préalable du
Center National de référence pour la Grippe ou de l'Institut Pasteur de Madagascar

Pour toute demande d'information, vous pouvez nous contacter à l'adresse e-mail suivante :
National Influenza Center Madagascar: nic-mada@pasteur.mg