

Manuel de prélèvement des échantillons primaires

Centre de Biologie Clinique



SOMMAIRE

	page
Introduction	5
I. Organisation du laboratoire	7
II. Information sur le catalogue des analyses du CBC.....	7
III. Le processus du prélèvement	8
1. Rôle du médecin prescripteur.....	8
2. Revue de prescription et enregistrement des demandes d'examen	9
3. Consentement des patients	9
4. Préparation du patient et/ou activités pré-prélèvement	9
5. Protocole et matériel de prélèvement	11
➤ Choix des tubes d'échantillon et du matériel de prélèvement.....	11
➤ Ordres des tubes	13
➤ Remplissage des tubes	14
➤ Autres matériels de prélèvement.....	14
6. Identification de l'échantillon.....	15
7. Recommandations à respecter en pré analytiques pour les prélèvements réalisés à l'extérieur du CBC	16
IV. Gestion des non-conformités, critères d'acceptation et de refus des échantillons	17
V. Quelques exemples des conséquences typiques de non-respect des conditions pré-analytiques sur les résultats	18
VI. Conduite à tenir en cas d'incident au cours du prélèvement	19
VII. Règles d'hygiène et de sécurité	20
VIII. Informations sur la phase post-analytique	25
1. Rendu des résultats d'examen	25
2. Heure de prélèvement.....	25
3. Résultats des examens anatomo-cytopathologiques.....	25
4. Rajout d'une analyse.....	25
IX. Modalités de recueil des échantillons primaires	26
1. Recommandations et modes opératoires.....	26
Recommandations pré-analytique – Maîtrise de l'échantillon	27
➤ Prélèvement sanguin	28
➤ Recueil pour cytologie ou cyto-bactériologie urinaire.....	29
○ Mode opératoire spécial pour pédiatrie	29
○ Mode opératoire spécial pour patient sonde à demeure	29
○ Mode opératoire spécial pour recueil d'urines de premier jet	30
○ Mode opératoire spécial pour recueil d'urines chez un patient incontinent ..	30

○ Mode opératoire spécial pour recherche de Mycobactéries	31
○ Mode opératoire spécial pour prélèvement par ponction vésicale sus pubienne	31
➤ Recueil des urines de 24 heures.....	31
➤ Recueil d'urines pour le "Compte d'Addis" (HLM).....	31
➤ Recueil pour prélèvement de selles	32
○ Recueil des selles pour la Coproculture.....	32
○ Recueil des selles pour la Coproculture cas particuliers	32
○ Recueil des selles pour la recherche d' <i>Helicobacter pylori</i>	32
○ Recueil des selles pour la recherche de sang	32
○ Recueil des selles pour la recherche d'amibes	33
○ Recueil des selles pour la recherche de kystes – œufs – parasites	33
➤ Réalisation d'un Scotch-test pour recherche d'oxyures (Test de Graham).....	33
➤ Recommandations pour le prélèvement génitales.....	33
○ Prélèvement urétral	33
○ Prélèvement vaginal	34
➤ Demande du laboratoire aux patientes avant l'acte de prélèvement	35
➤ Recueil de sperme en vue d'un spermogramme ou d'une spermoculture.....	36
➤ Prélèvement de chancre	36
➤ Réalisation d'un test de Hühner.....	36
➤ Dosage hormonal	37
➤ Dosage de médicaments.....	37
➤ Prélèvement de gorge.....	37
➤ Prélèvement naso-pharyngé	37
➤ Prélèvement nasal	38
➤ Prélèvement d'Expectoration.....	38
➤ Prélèvement de Lavage Broncho-Alvéolaire (LBA et mini-LBA)	39
➤ Prélèvement distal protégé (PDP)	39
➤ Fibro-aspiration et Aspiration endotrachéale.....	39
➤ Prélèvement de pus pour la recherche de bactéries pathogènes	40
○ Pus superficiel	40
○ Pus profond	42
➤ Prélèvement pour Hémoculture.....	42
➤ Prélèvement de peau et de phanères à visée mycologique.....	44
➤ Prélèvement pour la recherche des microfilaires.....	44
➤ Prélèvement oculaire.....	44
➤ Dépistage de diabète gestationnel	45

○ Test de "O'Sullivan".....	45
○ Dépistage du diabète gestationnel selon les recommandations "OMS".....	45
○ Dépistage du diabète gestationnel avec charge de 75g de glucose	46
○ Hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO - Confirmation)	46
➤ Hyperglycémie provoquée simplifiée (HGPS)	46
➤ Glycémie post-prandiale (GPP).....	47
➤ Test au Synacthène immédiat.....	47
➤ Prélèvement placentaire.....	47
○ Biopsie placentaire	47
○ Frottis placentaire	47
➤ Prélèvement des échantillons pour la recherche de Bacille de Koch (BK) dans d'autres échantillons	48
2. Modes opératoires relatifs aux analyses d'anatomo-cytopathologie.....	48
➤ Conseil pour la réalisation d'un prélèvement.....	48
➤ Acheminement d'un prélèvement fixé.....	49
➤ Acheminement d'un étalement sur lames.....	49
➤ Acheminement d'un liquide pour étude cytologique.....	49

La version électronique fait foi

INTRODUCTION

Ce manuel s'inscrit dans la démarche qualité du Centre de Biologie Clinique qui a pour objectif la satisfaction des utilisateurs par l'engagement du laboratoire à :

- Veiller au bien-être, à la sécurité et le respect des droits des patients
- Rendre des résultats justes dans les délais appropriés, en utilisant des techniques analytiques aux performances optimales, avec l'aide maximale aux cliniciens quant à l'interprétation des résultats »

Ce manuel décrit principalement les recommandations pré-analytiques et les informations aux activités de pré-prélèvement. Le respect de cette étape est primordial pour donner aux résultats d'analyses et d'examens toute la validité que les patients et prescripteurs sont en droit d'attendre.

La rédaction de ce manuel répond à plusieurs objectifs :

1. Transmettre les informations nécessaires ainsi que les exigences à respecter aux préleveurs internes du laboratoire ou externes pour que les prélèvements soient réalisés et pris en charge dans le respect des conditions pré analytiques et garantir ainsi la validité du résultat,

2. Permettre une formation adéquate des personnes qui sont amenées à réaliser et ou acheminer les prélèvements au laboratoire,

3. Répondre aux exigences de la norme NF EN ISO 15 189 « Laboratoires médicaux – Exigences concernant la Qualité et la compétence ».

4. Donner l'opportunité aux utilisateurs et les aider concernant le choix des méthodes d'analyse et l'interprétation des résultats d'examen.

Ce manuel de prélèvement est diffusé sous 2 formes :

- **Format papier**, uniquement pour la diffusion en interne
- **Format électronique** dans la base du laboratoire et via le site Internet de l'Institut Pasteur de Madagascar (www.pasteur.mg), destiné pour tout autre utilisateur, diffusion non gérée.

Une revue du manuel est réalisée régulièrement et la version numérique en ligne sera mise à jour et fera foi. La version papier du manuel est également à jour au laboratoire et au Centre de prélèvement. L'ensemble du personnel réalisant le prélèvement sera informé du changement apporté.

Des extraits de ce Manuel codifiés ou des pages du Manuel peuvent être affichés dans les boîtes de prélèvement au laboratoire et au Centre de prélèvement. La diffusion de ces extraits et de ces pages est assurée par les responsables qualité du laboratoire.

Ce manuel s'adresse aussi bien au personnel du Centre de Biologie Clinique habilité ou en cours d'habilitation pour réaliser les prélèvements qu'aux personnes extérieures au laboratoire susceptibles de réaliser des prélèvements.

Les versions en vigueur des feuilles de prescription et catalogue des analyses, sont également mises en ligne sur le site de l'Institut Pasteur de Madagascar.

Il apporte la preuve que le laboratoire met à disposition aux professionnels de santé toutes les procédures et instructions liées aux processus pré-analytiques.

Cependant, il est toujours possible de contacter le laboratoire et les centres de prélèvements pour toutes informations complémentaires. Le laboratoire reste attentif à toutes remarques ou suggestions qui aideraient à l'amélioration de ce document.

La prescription d'un examen au Centre de biologie Clinique vaut acceptation des modalités du présent manuel.

Il est rappelé aux prescripteurs, patients, partenaires, acteurs du secteur de la santé, quelques articles du Décret n° 98-945 du 04 Novembre 1998 Portant CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE :

Article 21 – *Tout partage d'honoraires entre médecins est interdit sous quelque forme que ce soit. L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires même non suivies d'effet, sont interdites.*

Article 23 – *Sont interdits :*

1. *Tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;*
2. *Toute ristourne en argent ou nature faite à un patient ;*
3. *Tout versement, acceptation ou partage clandestin d'argent entre praticien ;*
4. *Toute commission à quelque personne que ce soit ;*
5. *L'acceptation d'une commission pour un acte médical quelconque et notamment pour examens, prescriptions de médicaments, d'appareils, envoi dans une station de cure ou maison de santé.*

Article 31 – *Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.*

Article 32 – *Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution.*

Article 69 – *Le médecin doit disposer au lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapports avec la nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en charge. Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu'il utilise et à l'élimination des déchets selon les procédures réglementaires.*

Il ne doit pas exercer sa profession dans les conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées. Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.

Article 86 – *Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou tout autre disposition qui aurait pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins.*

I. Organisation du laboratoire

Le Centre de Biologie Clinique réalise des prélèvements au laboratoire sise à Ambatofotsikely et dans le Centre(s) de prélèvement (cf. site internet de l'IPM).

❖ Horaires :

Le laboratoire à Ambatofotsikely est ouvert 7j/7 - 24h/24

Pour le(s) Centre(s) de prélèvement les horaires d'ouverture et d'accueil sont consultables sur le site internet de l'Institut Pasteur de Madagascar (www.pasteur.mg), rubrique « Analyse de biologie médicale ».

❖ Contacts pour prise de rendez-vous ou demande d'information :

- Adresses e-mail : cbc@pasteur.mg , secretariatcbc@pasteur.mg
- Secrétariat Ambatofotsikely : +261 20 97 412 70 (standard IPM)
- Secrétariat Ankorondrano : +261 34 02 426 66
- Secrétariat Anosy : +261 34 02 426 65

Les patients ou leur correspondant peuvent désormais prendre un rendez-vous en ligne en se connectant sur <https://www.planeo.mg/root/home> .

Le laboratoire est sous la responsabilité des médecins biologistes et/ou pathologistes :

RANDRIANIRINA Frédérique, Chef de service, Médecin biologiste responsable technique du secteur microbiologie et Post-analytique.

RATSIMA Hariniaina Elisoa, Médecin biologiste, adjointe au chef de service, responsable technique du secteur Immuno-sérologie et Biochimie.

RAMPARANY Lovasoa, Médecin biologiste, adjointe au chef de service, responsable technique du secteur Pré-analytique et Hématologie.

SAMBANY RASOANARIVAO Heryliva, Médecin biologiste

RAHARISOLO Clairette, Docteur en médecine, AFSA Anatomie et cytologie pathologiques, adjointe au chef de service, responsable technique du secteur Anatomo-Cytopathologie.

RAMAMBATIANA Henintsoa, Médecin Anatomo-Cytopathologiste.

II. Information sur le catalogue des analyses du CBC

Le catalogue des analyses du CBC présente l'ensemble des analyses réalisées au laboratoire. Il fournit aussi les informations et instructions relatives aux :

- Activités de pré-prélèvement, prélèvement
- Nature et quantité de l'échantillon primaire
- Les méthodes analytiques
- Au transport
- Le délai de rendu des résultats, la cotation, les précautions à respecter
- Valeurs de référence ou interprétation clinique,
- Possibilité de rajout d'analyses...

Il est disponible pour consultation à l'accueil et sur le site Internet www.pasteur.mg (rubrique « Analyse de biologie médicale »).

Les analyses non réalisées par le laboratoire sont sous-traitées au laboratoire Cerba en France.

Le catalogue des analyses du laboratoire Cerba est sur le site www.lab-cerba.com.

III. Le Processus du prélèvement

1. Rôle du médecin prescripteur

Il est conseillé que l'ordonnance comporte de manière lisible les éléments suivants :

- Identification du prescripteur et son numéro d'inscription à l'ordre de médecin (ONM) le cas échéant. Si ces derniers sont rattachés à un service de Santé, ces coordonnées peuvent être demandées : hôpital, service, ... Un numéro de téléphone est souhaitable pour contacter le prescripteur en cas de résultats « urgents » ou demande d'information complémentaire.
- Identification univoque du patient (nom avec mention du nom de jeune fille le cas échéant, prénoms, date de naissance, sexe, ...). Ces éléments sont utilisés pour différencier les homonymes, lier le patient à ses antécédents et attribuer les valeurs de références adaptées (homme ≠ femme ≠ enfant)
- Nature du ou des prélèvements. L'absence ou l'erreur d'identification du prélèvement ou de l'échantillon constitue un critère de non-conformité, elle est enregistrée comme telle dans le système informatique du laboratoire et peut entraîner la non-exécution des actes.
- Analyses demandées

Les renseignements cliniques doivent figurer sur l'ordonnance pour l'interprétation des résultats. Il peut s'agir de renseignements physiologiques (comme la grossesse), pathologiques ou cliniques, des traitements en cours avec indication de la posologie (pour traitement AVK) ou encore de renseignements sur l'état de jeûne ou autre préparation du patient. Ces informations doivent être communiquées au laboratoire.

La fréquence de prescription des analyses est du ressort du médecin traitant selon le contexte clinique, économique, les résultats des analyses et des autres examens paracliniques.

Si le prélèvement n'est pas réalisé au laboratoire, la **date et l'heure de prélèvement** doivent également être indiquées ainsi que **le service hospitalier** (au dos de l'ordonnance par exemple) le cas échéant.

Pour un prélèvement destiné aux analyses anatomo-cytopathologiques, les éléments suivants doivent parvenir au laboratoire :

- Date du prélèvement
- Identification du patient : nom et prénom, nom de jeune fille, sexe, date de naissance, adresse complète
- Service demandeur : Médecin prescripteur, Hôpital, service
- Noms des différents médecins auxquels le compte rendu devra être adressé
- Constatations cliniques, radiologiques et biologiques préopératoires
- Eventuelles questions particulières posées au pathologiste
- Type et siège du prélèvement
- Date et type de fixation du prélèvement.

2. Revue de prescription et enregistrement des demandes d'examen

Cette étape est réalisée conformément au document CBC PRE MO-009 « Revue de prescription et enregistrement des demandes d'analyse ».

Ce document renseigne les dispositions relatives à :

- La traçabilité univoque du patient
- La possibilité des demandes formulées oralement ou sans prescription
- La possibilité de réaliser des examens sous anonymat
- La prise en charge des patients qui se présentent avec deux prescriptions de médecins différents, mais avec quelques analyses en commun.

Tout problème de lecture ou question concernant la demande doit être solutionné(e) avec un biologiste ou un cadre médico-technique du laboratoire en particulier les problèmes concernant la lecture ou la signification d'une prescription ou le choix de la méthode effectuée par rapport aux desiderata du demandeur ou encore la capacité du laboratoire de répondre aux demandes de prestations.

3. Consentement des patients

Tout acte de prélèvement quel que soit sa nature, doit avoir le consentement du patient.

Ce consentement est implicite dès lors que le patient (en présence du tuteur légal pour les mineurs et handicapés) se soumet volontairement à la procédure de prélèvement d'échantillon (ponction veineuse, prélèvements génitaux, ...).

Si, dans le cas d'urgence, l'obtention du consentement n'est pas possible, le laboratoire peut effectuer les procédures nécessaires, à condition qu'elles soient dans l'intérêt du patient.

Pour les procédures spéciales (analyses génétiques, ...) les dispositions du laboratoire sont renseignées dans le document CBC PRE MO-022 : Enregistrement des demandes d'analyses sous-traitées chez CERBA.

4. Préparation du patient et/ou activités pré-prélèvement :

❖ Heures du prélèvement :

Les prélèvements sanguins peuvent être pratiqués à toute heure de la journée sauf pour les analyses avec recommandations particulières mentionnées dans le catalogue du CBC ou du laboratoire CERBA.

❖ Statut alimentaire du patient :

L'état de jeûne est un des éléments déterminant pour certaines analyses et l'interprétation pertinente des résultats. Le jeûne du patient, même s'il est souvent préférable, n'est strictement nécessaire que pour quelques analyses désignées dans **le tableau 1** (les principales sont les glycémies et les explorations lipidiques avec un jeun impératif) et dans le catalogue des analyses du laboratoire.

L'état de jeûne correspond à l'absence de toute prise alimentaire dans les 10 à 12 heures qui précèdent le prélèvement. La consommation d'eau est autorisée pendant la période de jeûne.

Si les prélèvements nécessitant un jeûne impératif sont réalisés en l'absence de « jeûne strict », cette information doit être communiquée au laboratoire afin qu'elle soit précisée sur le compte rendu d'examen.

Chez les nouveau-nés et les nourrissons, le jeûne est impossible à réaliser. Il est donc nécessaire de communiquer l'heure de la dernière tétée / dernier repas lors de l'enregistrement.

En cas d'urgence, le non-respect du jeûne ne saurait constituer un obstacle à un examen, les modalités d'interprétation des résultats ne sont alors plus les mêmes, et c'est au clinicien d'interpréter les résultats.

Tableau 1 : Jeun et analyses (liste non exhaustive)

Le jeûne est : IMPERATIF	Acide urique (AU), Glycémie (GJ), Triglycérides (TG) Cholestérol (CT), LDL/HDL, Tests dynamique pour le dépistage du diabète, Test au synacthène
Le jeûne est : PREFERABLE	Calcium (Ca) Electrophorèse des protéines sériques (ELEC), Fer, CREATININE (CRE)... Enzymes hépatiques : ALT/AST (transaminases), GGT, Bilirubines, PAL ... Enzymes cardiaques : CK, LDH, CKMB ... Hémogramme (NFS), Vitesse de SEDIMENTATION Tests de coagulation : TQ INR, FIB, TCA, TS, ... Analyses hormonales : Prolactine (PRL)...
Le jeûne est : INUTILE	Analyses sérologiques : BW, HIV, SBILH, AMIBS, TOXO, RUB, TUBEX (sérologie de la typhoïde), HEPATITES (A, B, C), ... Marqueurs tumoraux : AFP, TPSA, ACE, PSAL, CA15-3, ... Auto- anticorps : RAI, COOMBS, Détermination du groupe sanguin Analyses hormonales FSH, LH, Progestérone, ... Etc...

❖ **Autres conditions de prélèvement**

- ✓ Rythme circadien

Le laboratoire préconise des horaires pour certains bilans sanguins

La concentration sanguine de certaines molécules est soumise à des variations significatives en fonction du moment de la journée (rythme circadien). Il s'agit par exemple des hormones suivantes : cortisol 8h ou 16h, ACTH....

- ✓ Historique d'administration de médicament, ...
- ✓ Conditions pour prélèvements génitaux et autres, ... cf. les modes opératoires respectifs
- ✓ Les prélèvements microbiologiques, les épreuves dynamiques et les analyses non réalisées par le laboratoire (confiées au laboratoire sous-traitant) peuvent nécessiter une consultation préalable du laboratoire ou d'un préleveur pour

expliquer les conditions à respecter et éventuellement pour récupérer les fiches de renseignement, de consentement et les matériels de prélèvement et/ou de conservation.

❖ **Instructions destinées au patient**

Le recueil d'un échantillon par le patient lui-même constitue un auto-prélèvement pour lequel le laboratoire, souvent par l'intermédiaire du préleveur doit exercer un conseil car tout mauvais recueil peut être la cause d'une non-conformité. Des instructions de recueil ou auto-prélèvement sont disponibles au laboratoire.

Les détails de la réalisation des différents prélèvements sont présentés dans le chapitre « Modalités de recueil ».

❖ **Protocoles destinés au patient et au préleveur (épreuves dites « dynamiques »)**

Les protocoles des tests dynamiques sont directement sous la responsabilité du préleveur qui doit préparer et organiser le test tout en informant le patient du protocole à suivre. Ces analyses ne sont réalisées qu'au laboratoire. Il s'agit par exemple du test au synacthène, du test O'Sullivan, OMS, du dépistage de diabète gestationnel ...

5. Protocole et matériels de prélèvement

Avant tout acte de prélèvement, il est OBLIGATOIRE de confirmer :

- L'identité (nom, prénom, date de naissance, ...) du patient en lui demandant directement
- La concordance de l'identité sur les étiquettes CB avec le patient si le prélèvement est réalisé au laboratoire ou dans un centre de prélèvement du CBC
- Le respect des conditions pré-analytiques (jeune, collect des urines de 24h,...)

❖ **Choix des tubes d'échantillon et du matériel de prélèvement**

Le choix des tubes et des matériels de prélèvement (volume, nombre de tubes et nature des adjuvants) se fait en fonction du document interne (CBC PRE MO-003 Prélèvement sanguin veineux) et des autres modes opératoires relatifs aux prélèvements.

Pour toutes les analyses réalisées par le laboratoire CERBA, se référer au catalogue des Analyses du laboratoire CERBA en ligne sur le site www.lab-cerba.com.

Tableau 2 : Choix des tubes en fonction des analyses (Voir page suivante, liste non exhaustive)


Type de tube	Analyses réalisées	
 Tube sec Capuchon rouge	Biochimie	
	Acide urique Amylase ASAT / ALAT Bicarbonates Bilirubine totale/conjuguée Calcium Chlorures Cholestérol total/ HDL Créatinine Créatine Phospho-Kinase (CPK) C Reactive Protein (CRP) Capacité de saturation transferrine Electrophorèse des protéines	Fer sérique Gamma-glutamyl-transférase (GGT) Lactate déshydrogénase (LDH) Lipase Magnésium Phosphore Phosphatase alcaline (PAL) Potassium Protéines totales Sodium Vitamine D Fructosamine...
 Capuchon GRIS Fluorure de sodium	Glucose et épreuves (test de O'sullivan, HGPS, HGPO, OMS, dépistage de diabète gestationnel avec charge de 75g de glucose...)	
 Tube sec Capuchon Rouge	Sérologies microbiennes	
	ASLO, Chlamydia trachomatis Salmonella Syphilis (TPHA),...	
	Marqueurs tumoraux	
	ACE, AFP, CA 125, CA 15-3, CA 19-9, CIFRA 21, NSE, SCC, PSA (total et/ou libre),...	
	Marqueurs cardiaques	
	CK MB, Troponine I, NT-proBNP	
	Hormonologie	Sérologie virale
β-HCG Cortisol FSH LH Oestradiol, Progestérone Prolactine Test au synactène (cortisol) T4L, T3L, TSH PTH Intact Hormone antimüllérienne (AMH)	Hépatite A (IgM,IgG) Hépatite B (Ag HBs, Ag HBe, Ac anti-HBs, IgM anti-HBc) Hépatite C (Ig totales anti HCV) HIV (sérologie) Rubéole (IgG + IgM) SARS-COV2 CMV (IgM et IgG)	

Type de tube	Analyses réalisées	
 Tube sec Capuchon Rouge	Sérologies parasitaires	Immunologie
	Amibiase, Bilharziose, Cysticercose (Elisa / Western Blot) Toxoplasmose (IgM + IgG),...	Ac anti-Thyroglobuline Ac anti-Thyropéroxydase
EDTA K2 ou K3  Capuchon VIOLET	Hématologie, virologie, hormonologie	
	Groupe sanguin Numération Formule Sanguin (NFS) Plaquettes Réticulocytes Recherche de parasites Vitesse de Sédimentation (VS) Test d'Emmel	
	Dosage, Recherche	
Citrate de sodium  Capuchon BLEU	Hémostase-coagulation	
	Fibrinogène TCA TP-INR D-dimères Plaquettes (si agrégats sur tube EDTA)	
Héparine de lithium 	Mycobactérie	
	QuantiFERON – TB Gold Plus, ...	

Note : En cas d'utilisation ou de réception d'autres tubes non spécifiés dans le présent manuel (exemple : tube hépariné, ...), se renseigner auprès des responsables du laboratoire.

❖ **Ordre des tubes**

Pour éviter toute contamination due aux différents anticoagulants contenus dans les tubes, il convient de respecter strictement l'ordre de remplissage suivant :



En cas d'hémocultures, elles sont à prélever AVANT les tubes.

Pour les prélèvements comportant un examen d'hémostase, un tube sec sans activateur ou tube de purge est à prélever avant le tube citraté.

Attention : il ne faut pas transvaser le sang d'un tube à l'autre ! risque d'interférence sur les résultats.

❖ Remplissage des tubes

D'une manière générale, les tubes doivent être remplis correctement, au niveau du trait de remplissage minimum.

Le tube citraté (bouchon bleu) doit impérativement être rempli correctement pour respecter le rapport sang/anticoagulant (neuf volumes de sang pour un volume d'anticoagulant), sous peine de fausser le résultat.

Si le tube citraté n'est pas correctement rempli le laboratoire peut refuser l'échantillon et demande un nouveau prélèvement.

❖ Autres matériels de prélèvement

En plus des tubes, sont utilisés pour le prélèvement (liste non exhaustive):



Sont présentés sur la photographie ci-dessous les différents consommables utilisés pour la réalisation des **prélèvements vaginaux** (pour examen cyto bactériologique des prélèvements vaginaux) **et frottis cervico-utérin (FCU)** (pour dépistage du cancer du col de l'utérus) **et le test de Hühner**.



Légende :

- ① Spéculum à usage unique,
- ② Spatule
- ③ Ecouillons de prélèvement
- ④ Bouillon BCC et/ou Eau physiologique
- ⑤ Cytobrush (prélèvement des cellules du col de l'utérus)
- ⑥ Ecouillon de kit GeneXpert®
- ⑦ Lames et lamelles pour observation au microscope et coloration
- ⑧ Compresses stériles
- ⑨ Fixateur (pour FCV)
- ⑩ Gants

Sont présentés sur la photographie ci-dessous les différents consommables utilisés pour la réalisation des **prélèvements urétraux**.



Légende :

- ① Ecouillons
- ② Bouillon BCC et/ou Eau physiologique
- ③ Ecouillon de kit GeneXpert®
- ④ Lames pour observation microscopique et coloration
- ⑤ Gants

Tout le matériel nécessaire décrit précédemment est fourni dans des contenants adaptés aux normes en vigueur sur demande de ceux-ci.

6. Identification de l'échantillon

Pour les prélèvements réalisés au laboratoire,

Le préleveur :

- Confirme avec le patient de la concordance de l'identité sur les étiquettes CB transmises avec la fiche individuelle
- Colle les étiquettes CB sur les échantillons immédiatement après l'acte de prélèvement et avant transfert dans la partie technique.

Pour les prélèvements réalisés à l'extérieur du laboratoire

Le préleveur doit :

- Demander l'identité du patient
- Faire une première identification provisoire, par inscription instantanée (au marqueur fin et indélébile) dès le prélèvement (ou le recueil), sur les tubes ou flacon, du nom et/ou du prénom et si possible la date de naissance du patient.

Dès l'acceptation et prise en charge de la demande au CBC, les fiches individuelles et étiquettes d'identification sont remises au correspondant, et apposées sur les échantillons par un personnel du CBC (les aides techniciens ou par les préleveuses) après contrôle minutieux de la concordance des identités sur les contenants et les étiquettes.

Les instructions sur la prise en charge des prélèvements réalisés à l'extérieur du laboratoire sont renseignées dans les documents :

- CBC PRE MO-005 : Contrôle, réception et enregistrement des prélèvements réalisés à l'extérieur du CBC
- CBC PRE PO- 002 : Organisation générale du secteur pré-analytiques, réception des prélèvements extérieurs.

7. Recommandations à respecter en pré analytique pour les prélèvements réalisés à l'extérieur du CBC.

Etape 1

Je vérifie:

- La conformité de la prescription
- La concordance entre la prescription et les tubes ou flacons

Etape 2

Je demande :

- Au patient de s'identifier
- Le respect des conditions de prélèvement (jeune, ...)
- Les renseignements cliniques utiles pour l'analyse ou examen (traitement en cours, ...)

Je prépare les matériels de prélèvement

J'explique au patient ce que je vais faire

Je rassure le patient

Etape 3: prélèvement

JE NE PRELEVE PAS :

- Sur la veine perfusée
- Au niveau d'un hématome
- Sur un cathéter

JE PRELEVE EN RESPECTANT L'ORDRE DES TUBES ET JE MELANGE LE PRELEVEMENT PAR RETOURNEMENT DOUX (5 FOIS) POUR LES TUBES AVEC ADDITIFS

A NE PAS FAIRE

- Transférer l'échantillon d'une seringue dans un tube
- Compléter un tube par le contenu d'un autre
- Induire l'hémolyse (garrot pas trop serré et en mois d'une minute)
- Agiter le(s) tubes

NB : pour les autres prélèvements (cf. Manuel)

Etape 4

- J'identifie bien les prélèvements
Genre - Nom, prénoms,
La date de naissance, date et heure de
prélèvement sont à renseigner sur la
fiche de prescription

Etape 5

- Je conditionne bien les prélèvements
- Ne pas mélanger le(s) prélèvement(s)
de patients différents dans un même
container

Etape 6

- J'achemine les prélèvements ou
- Je demande à la famille de le faire

En respectant les conditions de transport décrites dans ce manuel et/ou le catalogue du CBC OU selon les conditions spécifiques transmises lors du retrait des matériels de prélèvement (Prélèvements à envoyer au laboratoire CERBA comme moelle, ...)



En cas de besoin :

Je contacte le laboratoire au 020 97 412 70

Je consulte le catalogue des analyses et le manuel de prélèvement sur le site

www.pasteur.mg

Le préleveur doit placer les échantillons dans des sachets individuels. L'ordonnance, accompagnée des renseignements utiles sont également introduites dans une autre poche de ce sachet (double poche ou poche « kangourou »).

La règle c'est UN PATIENT = UN SACHET ou plus le cas échéant (si prélèvements de différentes natures).

Il est recommandé de ne pas mettre plusieurs échantillons provenant de plusieurs patients dans le même sachet transmis.

❖ **Température de stockage et de transport :**

Par défaut, en dehors des spécifications contraires décrites dans le catalogue et en tenant compte des délais maximum de transport définis ci-dessous, la plage standard de température de stockage des échantillons, acceptable par le laboratoire pour la plupart des analyses, s'étend de +2°C à +27°C c'est-à-dire une plage large, correspondant à une température réfrigérée ou à une température ambiante (pour les prélèvements sanguins sur tube primaire,...) et entre +2°C et +8°C pour certains prélèvements (sérum ou plasma).

Il convient donc pour les aides techniques ou le personnel de garde d'être très vigilant et de vérifier la température des échantillons à la réception.

En cas de doute sur les températures à réception, le laboratoire peut être amené à refuser la réalisation des analyses.

Certains prélèvements envoyés pour analyse au Laboratoire Cerba nécessitent une congélation immédiate des sérums (ammoniémie par exemple). Dans ce cas, la réalisation des prélèvements au laboratoire est obligatoire.

❖ **Délais de transport**

Dans tous les cas, s'informer auprès du laboratoire ou sur le site (se référer au catalogue, ce manuel, ...)

Le délai maximum d'acheminement des prélèvements au laboratoire est d'environ 4 heures. Les plasmas et sérums peuvent être envoyés à température réfrigérée (+2°C à +8°C) si ce délai peut ne pas être respecté.

Il est interdit de transporter les prélèvements dans les poches des vêtements.

Les prélèvements avec des conditions spécifiques sont à réaliser uniquement au laboratoire. Exemple : une centrifugation immédiate, ...

IV. Gestion des non-conformités, critères d'acceptation et de refus des échantillons

Les échantillons transmis au laboratoire ne pourront être traités que si la qualité et les conditions de transmission des prélèvements sont respectées.

Les échantillons prélevés à l'extérieur sont transmis au laboratoire par un correspondant (soit par l'intermédiaire d'un coursier, soit par le préleveur ou encore par le patient ou sa famille).

Lors de la réception des échantillons par le personnel habilité du laboratoire, des non-conformités peuvent être décelées dans ce cas, les prélèvements non conformes qui ne font pas l'objet de dérogation sont refusés.

Le patient ou la personne qui apporte l'échantillon est informé de la cause de refus de l'échantillon et le laboratoire lui explique la procédure pour le recueil d'un nouveau prélèvement conforme et si besoin lui délivre un kit de prélèvement.

Ces informations sont enregistrées dans le dossier du patient dans le SIL.

Les types de non-conformité, critères d'acceptation et de refus des échantillons sont détaillés dans le document associé CBC PRE PO-002/03.

V. Quelques exemples des conséquences typiques de non-respect des conditions pré-analytiques sur les résultats

❖ Augmentation de la kaliémie (potassium)

Des conditions pré-analytiques rigoureuses doivent être respectées pour cette analyse car le taux de potassium sérique est très sensible, même en dehors de toute hémolyse détectable, au choc thermique (température trop élevée ou au contraire trop basse), au choc mécanique (retournements trop violents des tubes, et surtout écoulement contrarié du sang) et encore au délai d'attente avant analyse. Il est donc impératif que les kaliémies (et donc les ionogrammes) ne soient pas prélevées avec des aiguilles trop fines ou en laissant le garrot trop serré. Il convient de recommencer tout prélèvement pour lequel l'écoulement n'aurait pas été parfaitement franc.

Il est conseillé de ne pas faire le prélèvement sur un cathéter ou du même côté que le cathéter. Le prélèvement se fera de l'autre côté du corps.

Ces mêmes problèmes pré analytiques liés à une hémolyse peuvent également intervenir pour d'autres dosages en particulier les dosages d'enzymes.

❖ Baisse de la glycémie

Lorsque la glycémie est pratiquée sur tube sec, le délai avant analyse doit être inférieur à 2 heures, faute de quoi le résultat peut s'effondrer en raison du phénomène de glycolyse. Pour les PEX qui ne sont pas transportés immédiatement au laboratoire, il est donc préférable de pratiquer des glycémies plasmatiques, prélevées sur tube gris avec anti-glycolytique (tube fluorure-oxalate).

❖ Augmentation de la numération des germes pour un ECBU

Si les urines pour un examen cyto bactériologique des urines sont recueillies dans un flacon sans conservateur et sans être apportées au laboratoire dans les 2 heures qui suivent le recueil, les résultats de la numération des germes peuvent être fortement majorés.

Dans le cas où l'acheminement est susceptible d'être plus long, il est donc impératif de transporter le prélèvement au froid (entre +2°C et +8°C) et de signaler le délai de transport au laboratoire.

VI. Conduite à tenir en cas d'incident au cours du prélèvement

Incident ou accident	Cause probable	Conduite à tenir
Malaise du patient qui reste cependant conscient	Anxiété, jeûne...	<p>Rassurer le patient.</p> <p>Arrêter le prélèvement et faire comprimer par le patient le point de prélèvement.</p> <p>Eviter la perte de connaissance en retenant l'attention du patient.</p> <p>Attendre que le patient revienne entièrement à lui et demander son accord avant de continuer le prélèvement ou ajourner le prélèvement.</p>
Hématome au point de prélèvement (même hématome différé)	Garrot trop serré, veine trop fine, piqûre hésitante, effet des traitements, anti coagulant...	<p>Rassurer le patient.</p> <p>Compresser le point de prélèvement.</p> <p>Poser une compresse alcoolisée.</p>
Perte de connaissance du patient	Anxiété, jeûne + causes médicales	<p>Arrêter le prélèvement.</p> <p>Attendre que le patient revienne entièrement à lui ou si nécessaire appeler le médecin sans laisser le patient seul. Mettre le patient en position latérale de sécurité si le malaise dure.</p> <p>Arrêter le prélèvement., proposer au patient de revenir dans les jours suivants.</p>

VII. Règles d'hygiène et de sécurité

Les précautions générales d'hygiène ou Précautions standard à respecter

Précautions	Recommandations
Si contact avec du sang ou liquide biologique	Après piqûre, blessure : lavage et antiseptique au niveau de la plaie Après projection sur muqueuse (conjonctive) : rinçage abondant (Voir détails dans « Conduite à tenir en cas d'accident d'exposition au sang »)
Lavage / désinfection des mains	Après le retrait des gants, entre 2 patients, entre 2 activités
Port de gants Les gants doivent être changés entre 2 patients, 2 activités	Si risque de contact avec du sang, ou tout autre produit d'origine humaine, les muqueuses ou la peau lésée du patient, notamment à l'occasion d'actes à risques de piqûre (prélèvement sanguin, dépose de voie veineuse, etc.) et lors de la manipulation des tubes de prélèvements biologiques, linge et matériels souillés. Lors des soins ou actes à risque, lorsque les mains du soignant ou du technicien comportent des lésions.
Port de surblouse, lunettes, masque	Si les soins ou manipulations exposent à un risque de projection ou d'aérosolisation de sang, ou tout autre produit d'origine humaine.
Matériels souillés	Matériel piquant / tranchant à usage unique : - Ne pas recapuchonner les aiguilles, ne pas les désadapter à la main, - Déposer immédiatement après usage sans manipulation un conteneur adapté situé au plus près du soin ou de la manipulation (paillasse) - Vérifier régulièrement le niveau maximal de remplissage des conteneurs à déchets Matériel réutilisable : - Manipuler avec précaution le matériel souillé avec du sang ou tout autre produit biologique d'origine humaine, - Vérifier que ce matériel a subi une procédure de désinfection ou de stérilisation appropriée avant d'être réutilisé
Surfaces souillées	Nettoyer puis désinfecter avec de l'eau de javel à 12° Chlore diluée au 1/10* fraîchement préparée (ou tout autre désinfectant approprié) les surfaces souillées par des projections ou aérosolisations de sang ou tout autre produit biologique d'origine humaine.
Transport de prélèvements biologiques, linge et matériels souillés	Les prélèvements biologiques, le linge et instruments souillés par du sang ou tout autre produit biologique doivent être évacués du service dans un emballage adapté, étanche, identifié et fermé.


Recommandation concernant le lavage des mains.

La friction hydro-alcoolique Comment ?



UTILISER LA FRICTION HYDRO-ALCOOLIQUE POUR L'HYGIENE DES MAINS !
LAVER LES MAINS AU SAVON ET A L'EAU LORSQU'ELLES SONT VISIBLEMENT SOUILLEES




Durée de la procédure : **20-30 secondes.**



Remplir la paume d'une main avec le produit hydro-alcoolique, recouvrir toutes les surfaces des mains et frictionner :




Paume contre paume par mouvement de rotation,




le dos de la main gauche avec un mouvement d'avant en arrière exercé par la paume droite, et vice et versa,




les espaces interdigitaux paume contre paume, doigts entrelacés, en exerçant un mouvement d'avant en arrière,




les dos des doigts en les tenant dans la paume des mains opposées avec un mouvement d'aller-retour latéral,



le pouce de la main gauche par rotation dans la paume refermée de la main droite, et vice et versa,



la pulpe des doigts de la main droite par rotation contre la paume de la main gauche, et vice et versa.



Une fois sèches, les mains sont prêtes pour le soin.

WORLD ALLIANCE
for PATIENT SAFETY

L'OMS remercie les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), en particulier les collaborateurs du service de Prévention et Contrôle de l'Infection, pour leur participation active au développement de ce matériel.

Octobre 2006, version 1.

Organisation
mondiale de la Santé


Toutes les précautions ont été prises par l'OMS pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le document est diffusé sans garantie, explicite ou implicite, d'aucune sorte. L'interprétation et l'utilisation des données sont de la responsabilité du lecteur. L'OMS ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable des dommages qui pourraient en résulter.

Le lavage des mains - Comment ?


LAVER LES MAINS AU SAVON ET A L'EAU LORSQU'ELLES SONT VISIBLEMENT SOUILLEES
SINON, UTILISER LA FRICTION HYDRO-ALCOOLIQUE POUR L'HYGIENE DES MAINS !




Durée de la procédure : 40-60 secondes




Mouiller les mains abondamment



Appliquer suffisamment de savon pour recouvrir toutes les surfaces des mains et frictionner :




Paume contre paume par mouvement de rotation,



le dos de la main gauche avec un mouvement d'avant en arrière exercé par la paume droite, et vice et versa,




les espaces interdigitaux paume contre paume, doigts entrelacés, en exerçant un mouvement d'avant en arrière,




les dos des doigts en les tenant dans la paume des mains opposées avec un mouvement d'aller-retour latéral,




le pouce de la main gauche par rotation dans la paume refermée de la main droite, et vice et versa,



la pulpe des doigts de la main droite par rotation contre la paume de la main gauche, et vice et versa.




Rincer les mains à l'eau,



sécher soigneusement les mains avec une serviette à usage unique,



fermer le robinet à l'aide de la serviette.



Les mains sont prêtes pour le soin.

Gestion des déchets

Les déchets sont traités conformément aux réglementations nationales en vigueur. Les dispositions sur la gestion des déchets du laboratoire sont renseignées dans le document **CBC PO-025** : Tri et élimination des déchets du laboratoire.

En fonction de leur nature, les déchets suivent plusieurs filières de traitement différentes :

- DAOM : déchet assimilé aux ordures ménagères : papiers, emballages, coton non souillé. Ces déchets sont à éliminer dans les poubelles de ville.
- DASRI : déchets d'activité de soin à risque infectieux.

Il existe plusieurs types de containers pour l'élimination des DASRI :

- Collecteurs spécifiques pour les objets piquants, coupants ou tranchants (OPCT)
- Cartons spécifiques plastifiés pour les déchets dits « mous ». Il est interdit de jeter toute aiguille, lame ou autre objet piquant coupant tranchant dans ces cartons.



Les consignes à respecter lors d'un accident d'exposition au sang ou à des produits biologiques sont renseignées dans le document HSQE AFF-HSE04 (cf page suivante). Les indications données quant aux consultations médicales sont applicables uniquement au personnel de l'Institut Pasteur de Madagascar.

Conduite à tenir en cas d'accident d'exposition au sang

(Voir page suivante)

Conduite à tenir devant un Accident avec Exposition au Sang (AES)

Qu'est-ce qu'un AES ?

Tout contact avec :

- du sang
- un liquide biologique contenant du sang
- un liquide biologique non visiblement souillé de sang mais considéré comme potentiellement contaminant (LCR, liquide pleural, sécrétions génitales, ...)



Quand est-ce qu'on peut l'avoir ?

Lors :

- d'une piqûre ou d'une coupure avec un objet contaminé (seringue, scalpel, ...)
- d'un contact sur peau lésée
- d'une projection sur muqueuse (œil, bouche, nez)

Que dois-je faire ?

En urgence, les premiers soins à faire

- Si piqûre, coupure ou contact sur la peau lésée :
 - Ne pas faire saigner
 - Nettoyer immédiatement la zone cutanée à l'eau et au savon, puis rincer
 - Désinfecter pendant au moins 15 min avec de l'eau de Javel diluée à 0,5% ou Dakin ou alcool 70°
- Si projection sur muqueuses :
 - Rincer abondamment au moins 15 min, au sérum physiologique ou à l'eau embouteillée propre.



Dans l'heure qui suit : prendre un avis médical

- Pour évaluer le risque infectieux en fonction du :
 - Statut sérologique de la personne source avec son accord (notamment vis-à-vis du VIH)
 - Type d'exposition
 - Immunité de la personne exposée (hépatite B)
- Pour mettre en route si besoin un traitement post-exposition le plus tôt possible et au mieux dans les 4h pour une efficacité optimale.

Dans les 24 heures

- Informer votre responsable hiérarchique
- Déclarer l'accident de travail auprès du **Service médical de l'IPM**
- Suivre les recommandations du médecin pour votre suivi clinique et sérologique.

Numéro d'urgence :

**Service médical IPM
034 49 260 82**

CODIFICATION	VERSION	DATE D'APPLICATION
HSQE AFF-HSE04	1	08/02/2021

VIII. Informations sur la phase post-analytique

1. Rendu des résultats d'examen

La date et, si possible, l'heure de rendu des résultats des analyses sont mentionnées sur la fiche individuelle remise au patient ou correspondant au moment de l'enregistrement de la demande. Toutefois si le patient ou prescripteur souhaite connaître le délai de rendu des résultats, ces informations sont mentionnées dans le catalogue du laboratoire.

La date de rendu de résultats partiels est inscrite manuellement sur la fiche individuelle.

Le laboratoire propose différents modes de transmission de résultats :

- Diffusion du compte rendu en version papier au laboratoire et au(x) Centre(s) de prélèvement. Le patient ou le correspondant doit se munir de la fiche individuelle remise à l'enregistrement du dossier ou d'une pièce d'identité.
- Diffusion par le serveur des résultats « mesanalyses.fr » en version numérique OU diffusion d'un ou des éléments des résultats par SMS, selon les éléments paramétrés dans le SERVEUR (INR, ...)
- Diffusion du compte rendu par téléphone. La diffusion de résultats par téléphone est strictement limitée et encadrée.

Pour les résultats URGENTS, le laboratoire informe le prescripteur ou contacte le patient ou le correspondant. Si le prescripteur n'est pas joignable, le laboratoire contacte le patient ou le correspondant pour les signaler le caractère URGENT de certains résultats d'examen qui doivent être transmis au médecin.

En cas de changement de rendu de résultats, le laboratoire informe le patient ou le correspondant de la nouvelle date de disponibilité des résultats.

2. Heure de prélèvement

Pour les prélèvements réalisés à l'extérieur du laboratoire, l'heure de prélèvement est saisie à l'accueil dans le dossier du patient.

Pour les prélèvements effectués au laboratoire et les centres de prélèvement, l'heure du prélèvement est généralement 10 à 15 mn après l'heure de l'enregistrement.

Pour les prélèvements envoyés au laboratoire CERBA, l'heure de prélèvement est renseignée sur la fiche de transmission

3. Résultats des examens anatomo-cytopathologiques

Pour tout renseignement sur les résultats d'anatomo-cytopathologie, la personne à contacter est le responsable du laboratoire d'anatomo-cytopathologie.

4. Rajout d'une analyse

Cette demande est possible pour les patients qui ne sont pas pris en charge par les établissements publics, les assurances et assimilés, sur demande des prescripteurs ou du patient.

Suite à la réception d'un compte rendu d'analyses, le prescripteur peut demander des analyses complémentaires. Cependant, elle ne sera acceptée par le laboratoire que si les

conditions pré-analytiques et post analytiques (le délai, la quantité, la conformité...) sont respectées. Le cas échéant, un autre prélèvement devra être effectué.

IX. Modalités de recueil des échantillons primaires

1. Recommandations et modes opératoires

ATTENTION !

Le non-respect d'un mode opératoire de recueil des échantillons risque de nuire considérablement à la qualité de vos examens et d'induire une interprétation erronée.

En secteur hospitalier :

- Réaliser les prélèvements du côté opposé de la perfusion,
- Ne jamais prélever sur le cathéter.
- Ne pas prélever sur une aiguille épicroânienne
- Ne pas prélever dans un hématome, un œdème, d'un bras avec greffe vasculaire, de bras paralysé ou de bras présentant des troubles de drainage lymphatique.
- Eviter les cicatrices et brûlures
- Ne pas transvaser le contenu d'un tube dans un autre (même pour les tubes de même couleur)

Au laboratoire, les recommandations sur le prélèvement et sur la réception des prélèvements venant de l'extérieur sont présentées sur la page suivante.

RECOMMANDATIONS EN PRE-ANALYTIQUE – MAITRISE DE L'ECHANTILLON

Avant le prélèvement

- *Je demande au patient de s'identifier : nom et date de naissance ou âge
- *Je demande si les conditions de prélèvement sont respectées
- *Je prépare les matériels de prélèvement
- *Je rassure le patient

Au moment du prélèvement (sanguin)

- *Je mets le garrot (<1min, à 10 cm du point de ponction)
- *J'aseptise l'endroit pour la ponction
- *Je prélève en respectant l'ordre et le remplissage des tubes
- *J'homogénéise les tubes, une fois d'abord

Règle d'hygiène et sécurité (prévention, AES)

- *Je porte une blouse, des gants et un masque
- *Je me lave les mains entre deux patients (devant les patients) / Je me frictionne mes mains à la solution hydro-alcoolique
- *Je change de paire de gants pour chaque patient
- *J'élimine correctement les matériels de prélèvements (déchets)

Aussitôt après le prélèvement

- *Je mets le pansement et je m'assure que le patient va bien
- *J'homogénéise les tubes par retournement doux (4 à 5fois) sans agiter les contenus
- *J'identifie les prélèvements par les étiquettes codes à barres

Réception des prélèvements venant de l'extérieur (PEX)

- *Je vérifie que le nom inscrit sur le tube ou contenant correspond à l'identité mentionnée sur les codes à barres
- *Je vérifie la conformité du (des) prélèvement (s) : type, quantité et qualité
- *Je prends la température du tube [sérum : +2°C à +8°C, tube primaire (sang total, urine, selles ...) ≤ +27°C]
(Pour les échantillons reçu au laboratoire à moins de 2 heures après le prélèvement, une température jusqu'à +28°C est acceptée)
- *J'identifie les prélèvements par les étiquettes codes à barres
- *Je complète le cahier de réception des prélèvements venant de l'extérieur

PRELEVEMENT SANGUIN

Vérifier la présence et la conformité de tout le matériel indispensable au prélèvement avant de procéder au prélèvement sanguin.

Demander au patient de dire son identité (Nom, prénom(s) et date de naissance).

Installer confortablement le patient.

Rassurer le patient et l'informer sur les conditions de prélèvements.

S'assurer de l'état de jeûne du patient pour les analyses nécessitant un jeûne impératif ou les recommandations spécifiques de certaines analyses (délai entre prise de médicament et prélèvement).

Sélectionner les tubes de prélèvements à utiliser en fonction des analyses prescrites (se reporter à la liste des analyses inscrites sur la fiche individuelle)

Préparer le matériel de prélèvement.

Se laver les mains devant le patient et mettre de nouveaux gants

Choisir le site de ponction. Ne jamais prélever sur un bras qui est perfusé.

Poser le garrot sans trop serrer.

Désinfecter le site de ponction.

Réaliser la ponction veineuse.

Desserrer le garrot dès que le sang s'écoule dans le tube.

Retirer le premier tube une fois rempli et homogénéiser par retournement doux une fois (une inversion complète)

Remplir les tubes supplémentaires successivement en respectant le volume de remplissage et l'ordre recommandé.

A la fin du prélèvement, quand tous les tubes sont collectés et que l'aiguille est retirée de la veine du patient, homogénéiser tous les tubes par 4 retournements doux supplémentaires.

Si un seul tube est collecté, le retourner 5 fois directement après le prélèvement.

Retirer le matériel de prélèvement, une fois le prélèvement terminé.

Eliminer le matériel de prélèvement dans le container prévu à cet effet.

Comprimer le site de ponction à l'aide d'un coton

Appliquer le pansement.

Dire au patient de faire une pression douce pendant 5-10 min et de ne pas plier le bras

Identifier chaque tube prélevé : étiquète codes à barres (au laboratoire) ou identification manuelle pour les prélèvements réalisés à l'extérieur.

Ranger les tubes sur un portoir ou les disposer dans un sachet kangourou.

Enlever les gants

S'assurer que le saignement s'est arrêté

Acheminer rapidement les échantillons au laboratoire (pour les prélèvements réalisés à l'extérieur du CBC).

RECUEIL POUR CYTOLOGIE OU CYTO-BACTERIOLOGIE URINAIRE

Cas du protocole « ECBU et échantillon d'urine standard (général) » :

Par mesure de simplification et d'uniformisation, le protocole habituel de l'examen « ECBU » est étendu au recueil général d'un échantillon d'urines qui doit toujours se faire dans un flacon stérile.

Le prélèvement doit de préférence être réalisé au moins 4 heures après la miction précédente, afin de permettre une stase suffisamment longue dans la vessie (temps nécessaire pour permettre la multiplication des germes).

Se laver les mains à l'eau et au savon

Effectuer une toilette intime soignée de préférence avec une solution Antiseptique, type Dakin ou Bétadine cutané.

Éliminer un premier jet d'urine dans les WC puis recueillir la suite des urines dans le flacon stérile fourni par le laboratoire, en prenant soin de ne pas toucher le bord supérieur du récipient. Identifier le prélèvement.

Faire parvenir le plus rapidement possible au laboratoire (à température ambiante dans les 02 heures qui suivent le prélèvement ou entre +2°C à +8°C dans les 12 heures qui suivent le prélèvement)

NB : un traitement antibiotique en cours ou datant de moins de 5 jours faussera cet examen ; dans ce cas, si l'examen ne peut être reporté, il convient impérativement de le signaler au laboratoire afin que le médecin soit informé pour interpréter les résultats.

Mode opératoire spécial pour pédiatrie

Le recueil s'effectue à l'aide d'une poche autocollante stérile, après désinfection du méat urinaire, du périnée et de la peau.

Se laver les mains à l'eau et au savon ou mettre des nouveaux gants.

Bien désinfecter les parties génitales à l'aide de lingettes ou cotons imbibés d'antiseptique en évitant de toucher la peau avec ses doigts (utiliser les compresses ou mettre des gants) ;

- pour les filles : d'avant en arrière sans revenir sur le geste ;

- pour les garçons : si le garçon n'est pas circoncis, décalotter avec précaution si possible et bien insister au niveau du méat.

Ouvrir la poche stérile.

Bien coller la poche sur la peau pour éviter les fuites.

La poche ne doit pas être laissée en place plus de 30 minutes pour éviter au maximum le risque de contamination et doit donc être changée à cette fréquence (si l'enfant n'émet pas d'urine).

Fermer soigneusement la poche et l'introduire dans le flacon propre offert par le laboratoire.

Ne pas transvaser les urines. Refermer immédiatement le flacon. Identifier le prélèvement puis le faire parvenir le plus rapidement possible au laboratoire

Mode opératoire spécial pour patient avec une sonde à demeure

Se laver les mains à l'eau et au savon ou mettre de nouveaux gants

Si possible réaliser le prélèvement lors du changement de la sonde.

Recueillir l'urine à partir de la nouvelle sonde après désinfection soignée du bout distal pour avoir un prélèvement plus représentatif des micro-organismes réellement présents dans la vessie.

Si cette dernière n'est pas possible :

Ne pas prélever dans le sac collecteur, Ne pas déconnecter la sonde du sac collecteur pour prélever les urines,

Clamper le tuyau d'excrétion pendant 15 à 20 min pour que l'urine s'accumule en amont.

Le recueil se fera par ponction avec aiguille stérile montée sur une seringue stérile sur le site spécifique (bout proximal plutôt du côté urétral) du dispositif de sonde après une désinfection minutieuse de cette dernière,

Transvaser l'urine recueillie dans un flacon stérile,

Identifier le flacon d'urine.

Faire parvenir le plus rapidement possible au laboratoire (à température ambiante dans les 02 heures qui suivent le prélèvement ou entre +2°C à +8°C dans les 12 heures qui suivent le prélèvement)

Mode opératoire spécial pour recueil des urines de premier jet

Le recueil du premier jet d'urine est indiqué notamment en cas de suspicion d'infection urétrale ou prostatique

Se laver les mains à l'eau et au savon.

Le prélèvement doit, de préférence, être réalisé à partir des urines de la nuit ou au moins 4 heures après la miction précédente.

Recueillir le premier jet d'urines directement dans le flacon stérile.

Identifier le flacon d'urine.

Faire parvenir le plus rapidement possible au laboratoire (à température ambiante dans les 02 heures qui suivent le prélèvement ou entre +2°C à +8°C dans les 12 heures qui suivent le prélèvement)

Mode opératoire pour recueil des urines chez un patient incontinent

- Chez la femme

Chez la femme incontinente, un prélèvement après toilette génitale soignée peut être considéré comme acceptable. Le recueil des urines par sondage urinaire à l'aide d'une sonde de petit calibre ne doit donc pas être systématique.

- Chez l'homme

Chez l'homme, le recueil par sondage urinaire à l'aide d'une sonde de petit calibre est à éviter car facteur de risque de prostatite. Il est préférable de recueillir l'urine au moyen d'un collecteur pénien (si disponible), voire par cathétérisme sus-pubien en cas de rétention d'urine (non réalisé au laboratoire).

Mode opératoire spécial pour recherche de mycobactéries :

Récupérer la **totalité des premières urines** émises le matin

Mode opératoire spécial pour prélèvement par ponction vésicale sus pubienne
(Prélèvement à réaliser en milieu hospitalier)

C'est une technique spécialisée surtout utilisée en cas de recueil impossible par voie normale. La vessie doit être pleine et repérable (la dernière miction doit remonter à 4 à 5 heures).

Après désinfection minutieuse de la peau, ponctionner directement l'urine dans la vessie à l'aide d'une seringue. Lors de ce prélèvement, les premières gouttes d'urines, potentiellement contaminées, doivent être éliminées.

RECUEIL DES URINES DE 24 HEURES

Le premier jour, au lever, éliminer la totalité de la première urine dans les toilettes et noter l'heure exacte.

Pendant les 24 heures suivantes (journée et nuit), recueillir **TOUTES** les urines dans le (ou les) flacon(s) (à maintenir de préférence au frais) y compris celles du lendemain matin à la même heure, précédemment notée. Utiliser des flacons propres (bouteilles d'eau par exemple).

Apporter le flacon rapidement au laboratoire

Il est capital de faire comprendre au patient que toute erreur dans la réalisation de ce protocole et donc sur le volume d'urines faussera directement le résultat (rendu en « masse par 24 heures »).

RECUEIL D'URINES POUR LE « COMPTE D'ADDIS » (H.L.M.)

Cet examen se pratique pendant une période de 3 heures, en position allongée et donc le plus souvent pendant les 3 heures qui précèdent l'heure habituelle de lever.

Trois heures avant le lever (utiliser éventuellement un réveil !), éliminer la totalité de vos urines dans les W.C. et noter l'heure exacte.

Boire environ un quart de litre d'eau.

Se recoucher et rester allongé, au repos et à jeun.

Trois heures exactement après l'heure retenue, après une toilette locale, recueillir la totalité des urines de 3 heures dans le flacon et l'apporter au laboratoire.

Eviter le recueil des urines pendant la période menstruelle.

NB : cet examen ne peut être pratiqué chez des personnes incontinentes car c'est une épreuve qui nécessite de s'abstenir d'uriner 3 heures d'affilée.

RECUEIL POUR PRELEVEMENTS DE SELLES

Recueil des selles pour la coproculture

Réaliser le prélèvement dans les premiers jours de la maladie et avant le début de l'antibiothérapie ou autres thérapeutiques intestinales (charbon...)

Il serait mieux de venir au laboratoire pour récupérer un pot stérile pour réaliser le prélèvement.

Selles liquides :

Recueillir directement les selles dans le pot fourni par le laboratoire ou dans un récipient propre.

Selles molles ou moulées :

Recueillir les selles dans le pot fourni par le laboratoire ou dans un récipient propre

A l'aide d'une spatule, mettre un échantillon dans le pot.

Rapporter le pot dans son sachet plastique le plus rapidement possible au laboratoire.

En cas de prise en charge technique différée, les selles sont à conserver à une température comprise entre +2°C et +8°C.

NB : un échantillon de selles de la taille d'une noix suffit. Ne pas remplir le pot. Eviter la souillure par les urines

Recueil des selles pour la coproculture : cas particuliers (Nourrisson ou personne portant des couches)

Ne pas apporter la couche au laboratoire

Transférer les selles dans le pot fourni par le laboratoire avec une spatule.

Rapporter le pot dans son sachet plastique le plus rapidement possible au laboratoire.

En cas de selles totalement liquides, un écouvillonnage rectal sera pratiqué au laboratoire

Recueil des selles pour la recherche d'*Helicobacter pylori*

Recueillir les selles dans un récipient propre ou dans le pot fourni par le laboratoire

A l'aide d'une spatule, mettre un échantillon dans le pot.

Apporter l'échantillon au laboratoire dans les 06heures qui suivent le prélèvement sinon le stocker entre +2°C et +8°C.

NB : un échantillon de selles de la taille d'une noix ou quelques ml de selles liquides suffisent. Ne pas remplir le pot. Eviter une souillure par les urines

**Recueil des selles pour la recherche de sang
(Recherche spécifique de l'hémoglobine humaine)**

Ne pas consommer pendant 2 à 3 jours avant le recueil des selles

- D'alcool, viande crue, vitamine C (plus de 250 mg/jour)
- Ni de médicaments à base d'aspirine ou dérivés
- Ni d'autres anti-inflammatoires.

Eviter les saignements des gencives lors du brossage de dents.

Pour les femmes, ne pas pratiquer le recueil pendant la période des règles.

Pratiquer 3 recueils différents, 3 jours consécutifs, en apportant chaque jour le flacon au laboratoire.

NB : un échantillon de selle de la taille d'une noix suffit. Ne pas remplir le pot, Eviter une souillure par les urines

Conservation avant analyse : température ambiante

Recueil des selles pour la recherche d'Amibes

Les analyses doivent être réalisées sur des selles fraîchement émises.

Eviter une souillure par les urines

Faire le prélèvement de préférence au laboratoire ou l'apporter le plus rapidement possible (environ 30minutes).

NB : un échantillon de selle de la taille d'une noix suffit. Ne pas remplir le pot. Bien fermer le récipient.

Conservation avant analyse : température ambiante

Recueil des selles pour la recherche de Kystes-Œuf-Parasites

Recueillir les selles dans un récipient propre ou dans le pot fourni par le laboratoire

A l'aide d'une spatule, mettre un échantillon dans le pot.

Apporter l'échantillon au laboratoire dans les 06heures qui suivent le prélèvement.

NB : un échantillon de selles de la taille d'une noix ou quelques ml de selles liquides suffisent. Ne pas remplir le pot. Eviter une souillure par les urines

Conservation avant analyse : température ambiante

REALISATION D'UN SCOTCH-TEST POUR RECHERCHE D'OXYURES (« test de Graham »)

Appliquer le matin, **avant la toilette et les premières selles**, un morceau de Scotch adhésif **transparent** au niveau de la marge anale.

Coller ensuite le Scotch à plat sur une lame de verre.

RECOMMANDATIONS POUR UN PRELEVEMENT GENITAL

PRELEVEMENT URETRAL

Réaliser le matin avant toute toilette et doit être fait au moins UNE (01) heure après la dernière miction.

Signaler toute antibiothérapie en cours.

Le prélèvement est réalisé au laboratoire.

PRELEVEMENT VAGINAL

Pas de rapport sexuel au moins 48 heures avant le prélèvement.

Pas de douche ou irrigation vaginale ni toilette intime la veille et le jour du prélèvement (lavage externe doux possible).

Pas d'usage local de gel, ni d'ovule 48 heures avant le prélèvement.

Le prélèvement doit être fait en dehors des règles.

Le prélèvement est réalisé au laboratoire.

Avant l'acte de prélèvement, le préleveur demandera aux patientes de lui prévenir si elles sont encore vierges. Cette demande est matérialisée par une affichette dans les salles pour prélèvement gynécologique, (voir page suivante).

La version électronique fait foi

DEMANDE DU LABORATOIRE AUX PATIENTES AVANT L'ACTE DE PRELEVEMENT POUR LES PRELEVEMENTS GYNECOLOGIQUES

**AOKA HILAZA MIALOHA
RAHA MBOLA VIRIJINY
Misaotra tompoko!**

**MERCI DE NOUS
PREVENIR SI VOUS ETES
ENCORE VIERGE**

RECUEIL DE SPERME EN VUE D'UN SPERMOGRAMME OU D'UNE SPERMOCULTURE

Une fiche d'instruction doit être récupérée au préalable au laboratoire et à rendre avec le prélèvement.

Le recueil de sperme est effectué au laboratoire de préférence (le transport du sperme altère la mobilité et la vitalité des spermatozoïdes) **avant 11 heures (réception du prélèvement au laboratoire)**.

Uriner avant de réaliser le recueil. Se laver les mains. Nettoyer soigneusement la verge avec de l'eau et du savon ou avec de la lingette antiseptique. Effectuer le recueil par masturbation, en une seule fois, dans le flacon stérile fourni par le laboratoire.

Si le recueil a été effectué à domicile : apporter le flacon rapidement (moins de 30 minutes) au laboratoire sans lui faire subir de variations importantes de température (pas de passage au réfrigérateur...) et à l'abri de la lumière. Il est possible de transporter le flacon dans son sachet sous une aisselle par exemple pour le maintenir à la chaleur corporelle.

Le flacon contenant le sperme doit être déposé directement au comptoir de réception des prélèvements apportés avant la prise en charge administratif (enregistrement, règlement des frais).

NB : avant le recueil, respecter une abstinence sexuelle (pas de rapports sexuels) de 3 jours minimum à 5 jours maximum.

PRELEVEMENT DE CHANCRE

Nettoyer les lésions avec du sérum physiologique stérile et gratter le fond du chancre au vaccinostyle (en évitant de faire saigner).

Recueillir la sérosité et les cellules avec un écouvillon sec stérile.

Réaliser un frottis.

L'examen direct n'est pas réalisé au CBC mais à envoyer à un laboratoire sous-traitant.

REALISATION D'UN TEST DE HÜHNER

PRELEVEMENT SUR RENDEZ-VOUS DE PREFERENCE

Ce test post-coïtal doit être réalisé en période pré-ovulatoire la veille ou l'avant-veille de la montée thermique (entre le 10^e et le 12^e jour du cycle si celui-ci est de 28 jours) ou se conformer à la prescription médicale. Une fiche d'instruction doit être récupérée au préalable au laboratoire et à rendre au moment du prélèvement.

Après une **abstinence sexuelle de 3 à 5 jours**, avoir un rapport sexuel entre **0h00 et 03h00 du matin**. Après le rapport, restez allonger environ **30 minutes**.

Sans avoir fait de toilette intime et en dehors de tout traitement local, se présenter au laboratoire de préférence sur **rendez-vous** entre 8h et 11h pour réaliser un prélèvement vaginal.

Ce test ne doit être pratiqué qu'après avoir réalisé un spermogramme chez le partenaire.

Dans tous les cas noter sur la fiche d'instruction :

- Le jour du cycle,

- L'heure du rapport.

DOSAGE HORMONAL

Pour les prélèvements hormonaux à effectuer à jour précis et/ou heure précise (ex : Cortisol 08h, FSH, LH, ... à faire au 2^{ème} jour ou 3^{ème} jour du cycle ou selon recommandation du médecin), il est recommandé de prendre un RDV au préalable.

DOSAGE DE MEDICAMENTS

S'informer auprès du laboratoire selon le type de médicament à doser et conformément aux instructions du laboratoire ou du sous-traitant.

PRELEVEMENT DE GORGE

Prélèvement à réaliser avant la mise en route du traitement antibiotique de préférence.

- Dégager la cavité buccale à l'aide d'un abaisse-langue.
- Éviter le contact avec la cavité buccale et la langue.
- Ecouillonner les amygdales, des piliers du voile du palais, muqueuses pharyngées et toutes surfaces d'aspect pathologique.
- Préconiser deux écouillons (un avec un milieu de transport) dont l'un sert à effectuer un étalement sur lame, l'autre avec milieu de transport étant destiné à la mise en culture.

À acheminer le plus rapidement possible au laboratoire (en moins de 2h)

Points particuliers où le prélèvement de gorge est inutile et/ou PROSCRIT :

- Phlegmon amygdalien : le prélèvement est obtenu par ponction et sera traité comme un pus profond (prélèvement effectué en milieu hospitalier).
- Epiglottite principalement due à *H. Influenzae* et *S. aureus* ou le diagnostic est effectué par hémoculture et au cours de laquelle le prélèvement de gorge est **FORMELLEMENT DECONSEILLE** du fait du risque de spasme pharyngolaryngé.
- Syndrome de Lemierre : infection exceptionnelle due à *Fusobactérium necrophorum* dont le diagnostic est effectué par hémoculture ou par ponction pleurale.
- La recherche de *O2* n'a aucun intérêt dans un prélèvement de gorge du fait de la fréquence du portage sain et du caractère invasif de l'écouvillonnage.
- Ulcération oro-pharyngée : le prélèvement de la lésion n'est pas recommandé en raison de la présence de tréponèmes commensaux, difficiles à distinguer de *Treponema pallidum* au microscope à fond noir, et de la plus faible sensibilité de l'immunofluorescence.

PRELEVEMENT NASO-PHARYNGE

- Utiliser un écouillon stérile, floqué.
- Donner au patient un masque chirurgical et lui demander de le mettre.
- Avant le prélèvement, demander au patient s'il est encombré (ou s'il a des sécrétions nasales) de se moucher.

- Demander au patient de bien s'asseoir, dos contre le dossier du fauteuil de prélèvement, baisser le masque juste sous le nez, de regarder bien droit et d'incliner légèrement la tête en arrière.
- Tenir l'écouvillon par l'extrémité distale de la tige, l'insérer dans la narine perpendiculairement au plan de la face.
- Pousser l'écouvillon délicatement le plus loin possible (5 à 7cm environ pour un adulte), en suivant le plancher de la fosse nasale et parallèlement au palais.
- Ecouvillonner l'épithélium des fosses nasales en réalisant des mouvements rotatifs pendant quelques secondes en grattant les parois du nasopharynx afin de recueillir des cellules.
- Retirer lentement l'écouvillon. Le coton de l'écouvillon doit être recouvert de mucus.
- L'écouvillon est ensuite plongé dans le milieu de transport fourni par le laboratoire.
- Le flacon ou tube contenant le prélèvement doit être soigneusement fermé.

PRELEVEMENT NASAL

Si le prélèvement nasopharyngé ne peut pas être réalisé à cause de l'anatomie du patient, un prélèvement nasal peut être effectué si la méthode analytique est réalisable sur ce type de prélèvement.

- Demander au patient de bien s'asseoir, dos contre le dossier du fauteuil de prélèvement, baisser le masque juste sous le nez.
- Tenir l'écouvillon par l'extrémité distale de la tige, l'insérer délicatement dans la narine (1 à 1.5 cm de profondeur).
- Ecouvillonner les fosses nasales antérieures en réalisant des mouvements rotatifs pendant 3 secondes et en exerçant une pression avec le doigt sur l'extérieur de la narine.
- Retirer l'écouvillon.
- Répéter l'opération dans l'autre narine en utilisant le même écouvillon, en exerçant une pression externe sur l'extérieur de l'autre narine.
- Pour éviter de contaminer l'échantillon, ne pas laisser l'extrémité de l'écouvillon toucher d'autres surfaces que la paroi interne de la narine.

PRELEVEMENT D'EXPECTORATION

Le prélèvement d'expectoration consiste à collecter l'exsudat purulent produit par l'arbre bronchique enflammé, lors d'un effort de toux. Il s'agit de mettre en évidence le germe en cause dans l'infection, en diminuant la contamination par la flore oropharyngée.

Pour cela, les crachats doivent être recueillis :

- **Si possible**, à jeun, au réveil après rinçage bucco-dentaire : ce qui permet de récupérer les mucosités accumulées au cours de la nuit,
- Dans un pot stérile,
- Après un rinçage de la bouche,
- Lors d'un effort de toux profonde ou par kinésithérapie : en informant le patient de la finalité de l'examen pour l'inciter à produire des mucosités bronchiques et non pas seulement de la salive (qui peut diluer l'échantillon et le contaminer).

Le risque de contamination étant élevé lorsque le malade tousse, le prélèvement doit être effectué à l'extérieur ou dans une pièce isolée devant une fenêtre ouverte et loin de toute personne.

Le flacon contenant le prélèvement doit être soigneusement fermé et doit être **ACHEMINE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE AU LABORATOIRE (en moins de 2h)**.

NB : Le prélèvement doit être réalisé avant tout traitement anti-infectieux. Sinon, il convient impérativement de le signaler au laboratoire afin que le médecin soit informé pour interpréter les résultats.

Pour la **recherche de mycobactéries (diagnostic de la tuberculose)**, l'échantillon de crachats doit être recueilli selon les modalités citées ci-dessus.

Contactez le laboratoire des Mycobactéries de l'Institut Pasteur de Madagascar pour obtenir plus d'informations.

À acheminer le plus rapidement possible au laboratoire (en moins de 2h)

PRELEVEMENT DE LAVAGE BRONCHO-ALVEOLAIRE (LBA) et MINI-LBA

Prélèvement à réaliser en milieu hospitalier

Le LBA est réalisé sous fibroscope. Il consiste à instiller après blocage du broncho-fibroscope dans une bronche segmentaire ou sous-segmentaire du sérum physiologique. Un volume total de 100 à 200 ml est administré par aliquotes successifs de 50ml. Les échantillons de 50ml de sérum physiologique sont instillés en 4 à 6 fois. La première aliquote qui représente la fraction bronchique ne peut pas être utilisée pour l'analyse microbiologique. Cette technique permet de recueillir entre 20% et 60% de la quantité injectée.

Un volume inférieur de 20 à 25ml, ou **mini-lavage**, peut être instillé, souvent à l'aveugle, afin de recueillir 2 à 3 ml d'échantillon.

À acheminer le plus rapidement possible au laboratoire (en moins de 2h)

PRELEVEMENT DISTAL PROTEGE (PDP)

Prélèvement à réaliser en milieu hospitalier

L'aspiration bronchique à l'aide d'un cathéter distal protégé est réservée aux malades intubés et ventilés. Ce prélèvement est fait à l'aveugle. Après injection d'1 ml de sérum physiologique et ré-aspiration à la seringue, l'extrémité du cathéter ou la brosse est coupée à l'aide de ciseaux stériles pour qu'elle « tombe » dans le sérum physiologique et placée dans un tube stérile avant **d'être adressée en moins de 2h au laboratoire**.

FIBRO-ASPIRATION et ASPIRATION ENDOTRACHEALE

Ce prélèvement est réalisé lors d'une fibro-bronchoscopie chez des patients atélectasiques ou si un doute persiste sur la présence d'un corps étranger endobronchique ou chez les malades intubés ou trachéotomisés à l'aveugle. Un système d'aspiration intense (poche d'aspiration reliée par 2 tuyaux au manomètre de dépression branché au vide mural) relié à la sonde d'aspiration stérile introduite dans la trachée permet le recueil des sécrétions.

Si les sécrétions sont peu abondantes, le médecin peut injecter un petit volume de sérum physiologique qui sera réaspiré et réalisera ainsi un **mini-lavage**.

Acheminer au laboratoire dans les 2h qui suivent le prélèvement au-delà entre 02°C à +8°C.

PRELEVEMENT DE PUS POUR LA RECHERCHE DE BACTERIES PATHOGENES

PUS SUPERFICIEL

Réalisation d'un écouvillonnage

Passer un écouvillon stérile de coton sur une surface de 1 cm² dans un mouvement de zigzag combiné à un mouvement de rotation. Placer de préférence l'écouvillon dans un milieu de transport.

Peau avec lésions cutanées superficielles

- Lésion superficielle fermée

Nettoyer la surface de la lésion avec une solution antiseptique afin d'éliminer la flore commensale puis essuyer avec une compresse imbibée d'eau physiologique pour éliminer toute trace d'antiseptique. Laisser sécher.

Le prélèvement peut être réalisé de 2 façons :

- Aspirer le pus au travers de la peau à la seringue avec une aiguille introduite dans le foyer infectieux. Et si le volume du prélèvement est faible, ajouter quelques gouttes de sérum physiologique stérile à l'aiguille.

Identifier la seringue avec le code à barre correspondant.

- Ouvrir la lésion avec la pointe d'un vaccinostyle. Imbiber un écouvillon avec quelques gouttes de sérum physiologique et prélever la sécrétion à l'aide de l'écouvillon. Réaliser 2 écouvillonnages, le premier est destiné pour l'examen direct et le deuxième pour la culture bactériologique.

Enlever le pansement s'il y en a.

Nettoyer avec la solution antiseptique le pourtour de la lésion à prélever afin d'éliminer la flore commensale.

Débarrasser la plaie des souillures superficielles avec des compresses stériles humidifiées avec de l'eau physiologique.

Procéder à l'écouvillonnage de la lésion en essayant de prélever les sécrétions les plus purulentes et en évitant de contaminer le prélèvement par des bactéries colonisant les alentours de la lésion.

Procéder à l'identique avec un deuxième écouvillon.

En présence de particules purulentes au bord de la lésion : prélever à la curette.

En cas de traitement antibiotique topique (local) : le traitement sera stoppé 48 heures avant le prélèvement pour éviter les faux résultats.

Le prélèvement doit être acheminé sous 2 heures à température ambiante au laboratoire.

Si le transport doit durer plus de 2 heures ou que la prise en charge de l'analyse est différée, l'échantillon doit être transporté dans un milieu de transport.

- **Lésion superficielle ouverte**

Enlever le pansement s'il y en a.

Nettoyer avec la solution antiseptique le pourtour de la lésion à prélever afin d'éliminer la flore commensale.

Débarrasser la plaie des souillures superficielles avec des compresses stériles humidifiées avec de l'eau physiologique.

Procéder à l'écouvillonnage de la lésion en essayant de prélever les sécrétions les plus purulentes et en évitant de contaminer le prélèvement par des bactéries colonisant les alentours de la lésion.

Procéder à l'identique avec un deuxième écouvillon.

Identifier les 2 écouvillons.

En présence de particules purulentes au bord de la lésion : prélever à la curette.

En cas de traitement antibiotique topique (local) : le traitement sera stoppé 48 heures avant le prélèvement pour éviter les faux résultats.

Inflammation cutanée, érysipèle, hypodermite

Désinfecter le site,

A l'aide d'une seringue et d'une aiguille fine, injecter dans la lésion un peu de sérum physiologique et ré-aspirer tout ce qu'il est possible d'obtenir,

Aspirer ensuite 1 ml d'eau physiologique dans la seringue pour éviter tout dessèchement de prélèvement et boucher stérilement.

Morsures

Aspirer le liquide présent dans la blessure avec une seringue,

Aspirer ensuite 1ml de sérum physiologique,

A défaut, après désinfection des zones proximales, pratiquer 3 écouvillonnages profonds (pour bactéries anaérobies, aérobies et examen microscopique). Utiliser un milieu de transport notamment pour la recherche des bactéries anaérobies.

Lésions unguéales

Couper toute la partie de l'ongle atteint avec des ciseaux stériles, jusqu'à la limite des tissus sains. Il est aussi possible de prélever des poussières d'ongles en raclant la tablette interne de l'ongle.

Placer dans un flacon stérile et adresser au laboratoire dans les heures qui suivent.

Prélèvement des plaies cutanées chez un brûlé

Prélèvement à réaliser en milieu hospitalier

Le mode de prélèvement se fait soit par écouvillonnage, soit par biopsie.

Réaliser 2 prélèvements à l'admission du patient : le premier sur la peau saine autour de la brûlure, le second sur la peau brûlée. L'humidification préalable de l'écouvillon sec avec du sérum physiologique stérile est conseillée, particulièrement pour les lésions sèches.

Au cours de l'hospitalisation, les prélèvements sont orientés par l'aspect clinique, la présence de pus, la lyse d'une greffe, l'aspect cartonné de la brûlure. Il est inutile de faire le prélèvement après détersion ou antiseptie, sauf orientation clinique précise.

Ulcération, escarre, lésions cutanées nécrotiques

Prélèvement à réaliser en milieu hospitalier

Ce prélèvement n'est indiqué que s'il y a des signes d'accompagnement locaux (douleur, inflammation péri-ulcéreuse, autres signes infectieux) ou généraux (fièvre, adénite, ...). Les escarres ne devront être prélevés qu'au stade III ou IV (c'est-à-dire lorsque la perte de substance atteint ou dépasse le fascia).

L'écouvillonnage est à proscrire car ils reflètent la colonisation bactérienne qui est souvent massive.

Nettoyer la plaie, éliminer les exsudats, débrider et exciser les tissus nécrosés, si nécessaire, appliquer le dakin et laisser sécher,

Nettoyer avec une compresse de gaze imprégnée de l'eau physiologique stérile,

Si des antiseptiques sont utilisés, ceux-ci doivent être éliminés par du sérum physiologique avant de réaliser le prélèvement.

Par ordre de préférence :

La biopsie tissulaire : à réaliser en structure hospitalière. Placer les prélèvements dans un tube stérile additionné de quelques gouttes de sérum physiologique pour éviter la dessiccation.

Aspiration à l'aiguille fine : la ponction est réalisée en passant par une zone saine, préalablement désinfectée. Si aucun liquide n'est aspiré, 1 à 2 mL de sérum physiologique sont injectés et aspirés à l'aide d'une seconde aiguille. La seringue ayant servi au prélèvement est transmise au laboratoire sans l'aiguille, purgée d'air, bouchée hermétiquement et stérilement.

Acheminer rapidement la seringue au laboratoire à température ambiante

Le curetage – écouvillonnage profond de l'ulcère :

Nettoyer la plaie

Éliminer les exsudats

Débrider les tissus nécrosés si nécessaire

Appliquer un antiseptique cutané et laisser sécher

Rincer au sérum physiologique stérile

Cureter le bord actif de la lésion

Récupérer les produits de curetage par écouvillonnage

Placer l'écouvillon dans un milieu de transport permettant éventuellement une culture anaérobie

Acheminer rapidement l'écouvillon au laboratoire à température ambiante

Adressé les prélèvements en moins de 2h au laboratoire

PUS PROFOND : Ce type de prélèvement est réalisé seulement en milieu hospitalier.

A acheminer au laboratoire dans les 2 heures, au-delà, entre +2°C à +8°C.

PRELEVEMENT POUR HEMOCULTURE

Le flacon d'hémoculture est fourni par le laboratoire. Il est à conserver à température ambiante sans précautions particulières.

Le prélèvement sera réalisé de préférence au moment d'un pic fébrile.

Le paramètre le plus influent sur la sensibilité de l'examen est la quantité totale de sang mise en culture lors d'un épisode clinique plus que le nombre de flacons.

Il existe une relation directe entre le volume total de sang cultivé et le rendement de la technique. Un volume insuffisant peut induire des faux négatifs.

Le volume requis est mentionné dans la feuille de recommandation jointe au kit d'hémoculture (cf. ci-dessous).

Une hygiène rigoureuse doit être respectée pour éviter le risque de contamination. Prendre la température du patient avant la prise de sang.

Ne jamais réfrigérer les flacons. Avant utilisation, ils sont conservés à température ambiante.

- Se laver et se désinfecter les mains,
 - Retirer la capsule de protection du flacon, désinfecter le bouchon du flacon d'hémoculture à l'aide d'alcool ou de solution iodée,
 - Désinfecter soigneusement la zone de ponction veineuse,
- Eviter le prélèvement par le biais des cathéters ou des voies fortement colonisées par des bactéries.

A. Si prélèvement à l'aide du dispositif de prélèvement

- Relier l'adaptateur au dispositif de prélèvement,
 - Pratiquer la ponction veineuse.
 - Vérifier que le sang s'écoule bien du patient vers le flacon. Eviter un éventuel reflux.
- Prélever une quantité de sang suffisante. S'aider du volume requis mentionné dans la fiche de recommandation (ci-dessous)

B. Si prélèvement à l'aide de seringue et d'aiguilles classiques :

- Prélever de façon aseptique la quantité de sang requise,
- Changer l'aiguille avant d'inoculer le flacon d'hémoculture,
- Introduire stérilement le sang à travers le centre du bouchon en caoutchouc du flacon.
- Désinfecter à nouveau après le prélèvement le bouchon du flacon.
- Replacer la cape de protection du flacon.
- Homogénéiser le sang et le bouillon par retournement doux du flacon.
- Bien identifier le (s) flacon (s).
- Noter la date et heure de prélèvement et la température du patient.

Acheminer le prélèvement le plus rapidement possible au laboratoire à température ambiante. **Ne jamais réfrigérer ni pré-incuber les flacons.**

Flacon d'Hémoculture et volume de sang à prélever :



POIDS DU PATIENT (Kg)	Volume de sang à prélever (ml)
1.1 – 2	1 à 3
2.1 – 12.7	3 à 6
12.8 – 36.3	3 à 10
> 36.3 (Adulte)	3 à 10

NE RIEN COLLER SUR LE COTE PORTANT LA DATE DE PEREMPTION.

Note : Le respect de ces recommandations assure la Qualité du prélèvement et garantit la Qualité du résultat

PRELEVEMENTS DE PEAU ET DE PHANERES A VISEE MYCOLOGIQUE

Prélèvement à réaliser avant la mise en route de tout traitement antifongique ou à distance si celui-ci a été débuté.

- Peaux : identifier la zone lésée. A l'aide d'un vaccinostyle ou d'une curette, prélever les squames en périphérie de la lésion, les déposer dans une boîte de pétri.
- Cheveux, poils : identifier la zone lésée, prélever les poils et cheveux à l'aide de la pince à épiler (racines nécessaires), en zone proximale (à la limite de la peau saine et de la peau malade). Déposer les échantillons dans une boîte de pétri.
- Ongles : à l'aide d'une coupe ongle, prélever l'ongle jusque dans la partie la plus proximale, à la limite de l'ongle sain et de l'ongle malade. Gratter les squames à l'aide d'un vaccinostyle ou une curette. Déposer les échantillons dans une boîte de pétri.
- En cas de lésion suintante, écouvillonner le pus et gratter le plancher de la lésion.

Individualiser les prélèvements correspondant à chaque localisation

Le conditionnement et le transport de ces produits biologiques se font en récipients stériles (tubes, flacons, petites boîtes de Pétri ...) bien fermés.

Pour les écouvillons, il est conseillé d'ajouter quelques gouttes de sérum physiologique stérile pour éviter la dessiccation.

De manière générale, les champignons survivent longtemps à sec et à température ambiante ce qui permet un envoi à distance sans risque de détérioration de ces prélèvements.

PRELEVEMENT POUR LA RECHERCHE DE MICROFILAIRES

Suivant l'espèce suspectée, le moment opportun de la recherche des Microfilaires dans le sang varie, cependant un prélèvement systématique à **midi** et **minuit** est recommandé :

- L'espèce *Loa loa* est particulièrement abondante dans le sang périphérique le jour.
- L'espèce *Wuchereria bancrofti* est nocturne.
- La variété *pacifica* de *Wuchereria bancrofti* est apériodique.

Un prélèvement de sang total avec anticoagulant EDTA permettra de rechercher les microfilaires. Les microfilaires peuvent se conserver 3 semaines entre +2°C et +8°C avec l'EDTA.

PRELEVEMENT OCULAIRE

Prélèvement à réaliser avant la mise en route de tout traitement local ou général (antiseptique ou antibiotique) et avant toute toilette oculaire depuis plusieurs heures. Si le patient a reçu un tel traitement, celui-ci doit être suspendu depuis au moins 24h.

- **Conjonctivite** : réalisable au laboratoire

Les prélèvements bactériologiques oculaires concernent essentiellement les prélèvements conjonctivaux.

Frotter doucement la conjonctive inférieure avec l'écouvillon en partant de l'angle externe pour aboutir à l'angle interne de l'œil où l'on récupère la sécrétion.

- **Blépharite** : réalisable au laboratoire.

Prélever les croûtes palpébrales et un ou deux cils à la pince à épiler stérile.

- **Orgelet et chalazion** : **Prélèvement à réaliser en milieu hospitalier.**

Inciser la tuméfaction avec un vaccino-style stérile pour prélever le pus (à la pipette ou à l'écouvillon).

- **Dacryocystite** : **Prélèvement à réaliser en milieu hospitalier.**

Recueillir le pus au niveau des points lacrymaux palpébraux à l'aide d'un écouvillon après pression sur les sacs lacrymaux.

Faire un deuxième écouvillonnage pour l'examen direct.

- **Endophtalmie** : **Prélèvement à réaliser en milieu hospitalier.** Prélever l'humeur aqueuse,
- **Kératites** : **Prélèvement à réaliser en milieu hospitalier.**

Le grattage cornéen est le prélèvement de référence. Gratter avec du matériel ophtalmologique la base et les berges de l'abcès après élimination des débris nécrotiques et fibrineux

Les prélèvements doivent être acheminés sous 4 heures à température ambiante au laboratoire. Si le transport doit durer plus de 4 heures, l'échantillon est conservé entre +2°C et +8°C.

DEPISTAGE DE DIABETE GESTATIONNEL

TEST DE « O'SULLIVAN »

A EFFECTUER IMPERATIVEMENT AU LABORATOIRE.

Le jeûne n'est pas obligatoire.

Faire boire une solution de **50g** de glucose délivré par le laboratoire.

Noter l'heure exacte : T = 0 et lui demander de rester à jeûn pendant l'épreuve.

Pratiquer une prise de sang sur tube sec ou « fluorure-oxalate » à T=60' (obligatoire).

NB : il est impératif que la patiente absorbe la totalité de la solution de glucose **et surtout qu'elle n'ingère plus rien jusqu'à la fin de l'épreuve.**

Si vomissements, il faut refaire l'analyse.

DEPISTAGE DE DIABETE GESTATIONNEL SELON LES RECOMMANDATIONS « OMS »

A EFFECTUER IMPERATIVEMENT AU LABORATOIRE

Jeûne obligatoire

Pratiquer une prise de sang à T0.

Faire boire une solution avec **75g de glucose préparé par le laboratoire.**

Noter l'heure exacte et lui demander de rester à jeûn et au repos pendant l'épreuve.

Pratiquer une seconde prise de sang sur tube sec ou « fluorure-oxalate » à T=120'.

NB : il est impératif que la patiente absorbe la totalité de la solution de glucose **et surtout qu'elle n'ingère plus rien jusqu'à la fin de l'épreuve.**

Si vomissements, il faut refaire l'analyse.

DEPISTAGE DIABETE GESTATIONNEL AVEC CHARGE DE 75g DE GLUCOSE

A EFFECTUER IMPERATIVEMENT AU LABORATOIRE

Jeûne obligatoire

Pratiquer une prise de sang à T0.

Faire boire une solution avec **75g de glucose préparé par le laboratoire.**

Noter l'heure exacte : T=0 et lui demander de rester à jeûn et au repos pendant l'épreuve.

Pratiquer une prise de sang sur tube sec ou « fluorure-oxalate » :60' après : T=60 (obligatoire)

Pratiquer une prise de sang sur tube sec ou « fluorure-oxalate » :120' après : T=120 (obligatoire)

NB : il est impératif que la patiente absorbe la totalité de la solution de glucose **et surtout qu'elle n'ingère plus rien jusqu'à la fin de l'épreuve.**

Si vomissements, il faut refaire l'analyse.

HYPERGLYCEMIE PROVOQUEE PAR VOIE ORALE POUR CONFIRMATION D'UN DIABETE GESTATIONNEL HPGO

A EFFECTUER IMPERATIVEMENT AU LABORATOIRE

La patiente doit être à jeûn depuis la veille au soir.

Pratiquer une première prise de sang sur tube sec ou « fluorure-oxalate » : T=0

Faire absorber une solution de **100 g** de glucose délivrée par le laboratoire.

Noter l'heure exacte.

Pratiquer une prise de sang sur tube sec ou « fluorure-oxalate » :60' après : T=60 (obligatoire)

Pratiquer une prise de sang sur tube sec ou « fluorure-oxalate » :120' après : T=120 (obligatoire)

Pratiquer une prise de sang sur tube sec ou « fluorure-oxalate » :180' après : T=180 (obligatoire)

NB : il est impératif que la patiente absorbe la totalité de la solution de glucose **et surtout qu'elle n'ingère plus rien jusqu'à la fin de l'épreuve.**

Si vomissements, il faut refaire l'analyse.

HYPERGLYCEMIE PROVOQUEE SIMPLIFIEE(HGPS)

A EFFECTUER IMPERATIVEMENT AU LABORATOIRE

Dépistage du diabète : chez l'adulte, femmes non enceintes et enfants.

(Charge de glucose : pour les adultes 75 g, pour les enfants : 1.75g/kg sans dépasser 75g)

Le jeun est obligatoire

Pratiquer une première prise de sang sur tube sec ou « fluorure-oxalate » : T=0

Faire boire une solution de glucose appropriée à l'âge et au poids du patient, préparée par le laboratoire.

Noter l'heure exacte et lui demander de rester à jeûn pendant l'épreuve.

Pratiquer une seconde prise de sang à T=120'.

Si vomissements, il faut refaire l'analyse.

GLYCEMIES POST-PRANDIALES (GPP)

Pour les glycémies à une heure prescrite (exemple à 11h, à 14h, cycle...), les différentes prises de sang sont effectuées à l'heure définie, sur tube sec ou « fluorure-oxalate », avec une marge de 5 à 10 minutes tolérée.

Pour les glycémies post-prandiales, c'est le délai après la fin du repas qui déterminera l'heure de la prise de sang 120 minutes après)

TEST AU SYNACTHENE IMMEDIAT

(TEST DE STIMULATION DE LA FONCTION GLUCOCORTICOIDE ET ANDROGENIQUE DE LA CORTICOSURRENALE)

A EFFECTUER IMPERATIVEMENT AU LABORATOIRE.

Au repos, pratiquer une première prise de sang sur tube sec, aux environs de 8 heures (7h00 à 9h00) du matin : T=0

Injecter en IM une ampoule de 0,25 mg de « Synacthène ® immédiat » **apporté par le patient et à conserver entre +2°C et +8°C jusqu'au jour d'utilisation.**

Noter l'heure exacte.

Pratiquer une prise de sang sur tube sec (pour COR) 60' après l'injection : T=60

PRELEVEMENT PLACENTAIRE

A EFFECTUER EN MILIEU HOSPITALIER OU MATERNITE (salle de travail)

Considérer tout produit biologique comme potentiellement contaminant. Réaliser les prélèvements en portant des gants et une blouse. Le port de masque et des lunettes est recommandé.

Avant d'effectuer le prélèvement, il faut éliminer l'excès de sang avec une compresse stérile aussi bien sur la face maternelle que fœtale du placenta.

Biopsie placentaire

Un échantillon du placenta peut être prélevé par biopsie, à l'aide d'un bistouri, d'une zone de 1 cm² d'aspect macroscopique anormal ou, à défaut, près de l'insertion du cordon si le placenta est apparemment normal.

Il est recommandé de prélever toute l'épaisseur du placenta.

La carotte placentaire recueillie est déposée dans un flacon stérile.

Frottis placentaire

Réaliser deux frottis : face maternelle et face fœtale du placenta.

Avec le petit bord d'une lame, racler la face fœtale du placenta de l'insertion du cordon vers les membranes puis étaler les produits recueillis en couche épaisse sur une autre lame. Procéder de la même façon pour la face maternelle. Les deux lames sont ensuite séchées à l'air libre.

Les deux étalements doivent être bien identifiés et bien rangés dans un porte-lame avant d'être acheminés au laboratoire.

Le morceau de placenta recueilli est déposé dans un flacon stérile, bien fermé. Il faut l'acheminer le plus rapidement possible au laboratoire, à défaut, le conserver entre +2°C et +8°C.

PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS POUR LA RECHERCHE DE BACILLE DE KOCH (BK) DANS D'AUTRES ECHANTILLONS

Les modalités de prélèvement, de transport, et de conservation des échantillons en vue de la recherche des bacilles de Koch et autres mycobactéries sont définies dans le manuel de prélèvement de l'unité des Mycobactéries **MYCO PRE PO-001**.

Dans les formes pulmonaires, privilégier les produits de l'expectoration spontanée.

Les crachats doivent être recueillis dans des pots stériles fournis par le laboratoire.

S'il est difficile d'obtenir une expectoration, le prélèvement du contenu gastrique par « tubage », réalisé le matin au réveil, à jeun, avant le lever du patient peut être réalisé.

Prélèvement à réaliser en milieu hospitalier

Pour plus d'informations, contacter le laboratoire des Mycobactéries de l'Institut Pasteur de Madagascar.

2. Modes opératoires relatifs aux analyses d'anatomocytopathologie

CONSEILS POUR LA REALISATION D'UN PRELEVEMENT

- Transmettre des pièces opératoires entières, non fragmentées, orientées et repérées
- Ne pas les déformer avec la pince.
- Pas de débris coagulés (bistouri électrique)
- Prévoir un flacon de transport **à goulot large et à capuchon vissant**.
- Pour les fragments minuscules, l'interprétation n'est pas toujours fiable (ex : ponction biopsie).
- Bien identifier les flacons : nom, prénom, âge, type de prélèvement, numéroté (si plusieurs flacons).
- Mettre l'étiquette d'identification sur la partie la plus large du flacon et contenant le prélèvement (pas sur le capuchon, ni sur le sachet, ni sur la partie haute d'une bouteille plastique).
- Bien mentionner les repères sur la feuille de prescription.

Bien renseigner la fiche de renseignements pour examen ACP (disponible sur le site internet de l'IPM).

ACHEMINEMENT D'UN PRELEVEMENT FIXE

- Introduire le fragment dans le flacon préalablement rempli de formol à 10% (et non l'inverse).
- Le volume de fixateur est de 10 fois le volume de la pièce.
- Le délai de fixation est de 24 à 72 heures (même plus).
- Ne pas utiliser de fixateur autre que le formol dilué à 10% (le liquide de Bouin est abandonné car il est toxique et des techniques de biologie moléculaire ne peuvent être réalisées).

ACHEMINEMENT D'UN ETALEMENT SUR LAMES

Prévoir au moins deux lames identifiées :

- 1 lame fixée au cytospray ou laque à cheveux,
- 1 lame séchée à l'air ambiant (coloration May-Grünwald-Giemsa),
- ± 1 ou 2 lames (étude histochimique éventuelle).

Bien identifier les lames (cf. pour l'examen anapath).

ACHEMINEMENT D'UN LIQUIDE POUR ETUDE CYTOLOGIQUE

Prélèvement dans un tube sec et stérile et acheminement immédiat (sinon, conserver le tube à + 4°C).

Bien identifier les tubes (cf. pour l'examen anatomo-cytopathologique).

INSTITUT PASTEUR DE MADAGASCAR – CENTRE DE BIOLOGIE CLINIQUE

MANUEL	CBC MP-001
MANUEL DE PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS PRIMAIRES	Version : 15
	Date d'application : 14/07/2025

REDACTEUR	VERIFICATEURS	APPROBATEUR	DESTINATAIRES
Lovaso RAMPARANY	Frédérique RANDRIANIRINA Heryliva SAMBANY RASOANARIVAO Haja Lalaina RAMAHERISON Nofiniaina RANDRIAMIARAMBOLA	Frédérique RANDRIANIRINA	Secrétaires Préleveurs Secrétaires préleveuses Techniciens préleveurs Personnes réalisant des prélèvements à l'extérieur du laboratoire
Médecin biologiste	Médecins biologiste Responsables qualité	Directeur du laboratoire	
Date : 03/06/2025	Date : 20/06/2025	Date : 05/07/2025	
Visa :	Visas :	Visa :	

Historique des modifications :

Date	Version	Nature des modifications
01/11/2010	1	Création du document
01/01/2013	2	Revue complète du Manuel
01/02/2015	3	Précision dans Introduction Rajout et précision dans §I. Organisation du laboratoire Rajout dans Heure de prélèvement pour le centre de prélèvement Rajout des précisions dans extrait de mode opératoire prélèvement sanguin Création du §IV. Critères d'acceptation et de refus des échantillons Des rajouts dans certains extraits de recueil des prélèvements
11/07/2016	4	Revue complète du document
26/03/2018	5	Précision dans Introduction Mise à jour du tableau 1 (Jeun et analyses) Mise à jour du tableau 2 (Choix de tubes en fonction des analyses) Mise à jour dans certaines recommandations de prélèvements

Historique des modifications :

Date	Version	Nature des modifications
20/08/2018	6	Mise à jour du numéro téléphone pour secrétariat Ankorondrano et suppression du paragraphe concernant les prélèvements à domicile dans § I. Organisation du laboratoire Rajout dans § III. 1. Rôle du médecin prescripteur. Précision dans §III. 2. Vérification de l'identité du patient et enregistrement de la demande. Rajout de précision dans §III. 4. Préparation du patient : Heure de prélèvement. Correction du nom du laboratoire CERBA, mise à jour du tableau 2 (Choix du tube de prélèvement), mise à jour image pot à selles et suppression des tubes pour le laboratoire CERBA dans §III. 5. Matériel de prélèvement Précision dans §III. 6. Identification de l'échantillon et §III.7. Règles de conservation des échantillons avant leur réception au laboratoire. Fusion § Gestion des non-conformités et Critères d'acceptation et de refus d'échantillons,
18/10/2018	7	Modification dans les chapitres III.4, III.5, III.6 et IX.1
25/03/2020	8	Mise à jour dans Introduction / 3 ^e point (titre de la norme) Mise à jour dans §I (horaires et composition de la direction du laboratoire) Suppression de prolactine dans rythme circadien Rajout d'une note pour le choix des tubes Mise à jour pour les consommables utilisés pour les prélèvements urétraux Mise à jour sur le prélèvement pour l'unité des Mycobactéries Mise à jour pour le prélèvement d'expectoration
26/08/2020	9	Mise à jour du tableau 2 Correction du prélèvement pharyngé en prélèvement de gorge Rajout des instructions pour le prélèvement nasopharyngé
23/11/2020	10	Mise à jour du tableau 2
21/12/2020	11	Mise à jour du tableau 2
02/11/2021	12	Mise à jour de la composition de la direction du laboratoire Mise à jour du Tableau 3 : Choix des tubes en fonction des analyses Modification dans Introduction et dans les chapitres relatifs aux Remplissage des tubes, §III.6 Identification de l'échantillon, §IX.1. Recommandations et modes opératoires. Rajout dans recommandation pour un prélèvement gynécologique Rajout de précision dans Test au Synacthène immédiat
02/05/2022	13	Suppression de la précision dans Prélèvement nasopharyngé que certaines analyses (recherche de SARS-CoV-2, ...) se font uniquement et sur rendez-vous au CBC Ambatofotsikely.
30/10/2023	14	Revue complète du manuel et ajout de la diffusion à la fin du document (version word)
14/07/2025	15	Revue complète du manuel

Documents associés :

- CBC MP-001/01 : Feuille de prescription
- CBC MP-001/02 : Catalogue des analyses du CBC
- CBC MP-001/03 : Liste des instructions relatives aux prélèvements – Extrait du manuel de prélèvement des échantillons primaires ou Extrait des modes opératoires
- CBC MP-001/04 : Instructions relatives au prélèvement d'urine pour un examen cytobactériologique (E.C.B.U.) chez un enfant
- CBC MP-001/05 : Instructions relatives au prélèvement d'urine pour un examen cytobactériologique (E.C.B.U.) chez un adulte
- CBC MP-001/06 : Instructions relatives au prélèvement d'urine de 24 heures
- CBC MP-001/07 : Instructions relatives au prélèvement d'urine pour le « compte d'Addis » (HLM)
- CBC MP-001/08 : Instructions relatives au prélèvement d'expectoration
- CBC MP-001/09 : Instructions relatives au prélèvement pour une hémoculture
- CBC MP-001/10 : Instructions relatives au prélèvement sanguin
- CBC MP-001/11 : Instructions relatives au prélèvement urétral
- CBC MP-001/12 : Instructions relatives au prélèvement d'origine génitale chez l'homme pour un spermogramme et/ou spermoculture
- CBC MP-001/13 : Instructions relatives au prélèvement vaginal
- CBC MP-001/14 : Instructions relatives au prélèvement d'origine génitale chez la femme pour un test de Hühner
- CBC MP-001/15 : Instructions relatives au prélèvement de pus pour la recherche de bactéries pathogènes